



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية



الديوان الوطني لامتحانات والمسابقات

امتحان بكالوريا التعليم الثانوي

الشعبة: علوم تجريبية

اختبار في مادة: علوم الطبيعة والحياة

دورة: 2020

المدة: 04 س 30 د

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين الآتيين

الموضوع الأول

يحتوي الموضوع الأول على (04) صفحات (من الصفحة 1 من 9 إلى الصفحة 4 من 9)

التمرين الأول: (05 نقاط)

مكنت دراسات أهمّها المعطيات الزلزالية من معرفة بنية وخصائص الكرة الأرضية بالرغم من أنّ أعمق نقطة تم الوصول إليها لا تتعدي 13 كيلومتراً. للتعرّف على بعض هذه الخصائص نقترح ما يلي:

أسماء البيانات المرقمة	الحالة الفيزيائية (صلب، لدن، سائل)	الصخر الاندساسى المميز	اسم الانقطاع
5	10	4	C
4	9	2	B
3	8	1	A
1	7		
6	10		
5	9		
4	8		
3	7		
2	6		
1	3		

1. أُنْقل الجدول على ورقة إجابتك ثم املأ الخانات وفق التّعليمات المطلوبة.

2. بيّن في نصّ علمي كيف تم استغلال المعطيات الزلزالية لمعرفة البنية الداخلية للكرة الأرضية مما سبق ومعلوماتك.

التمرين الثاني: (07 نقاط)

ترتّكز خاصية التأثير التّوّعي المزدوج للأنزيم على تشكّل معقد "أنزيم - مادة التفاعل" تنشأ أثناء حدوثه روابط انتقالية بين جزء من مادة التفاعل ومنطقة خاصة من الأنزيم تدعى الموقع الفعال. لفهم كيف استغل الخبراء هذه الخاصية في انتاج دواء ناجع مع أعراض جانبية محدودة تُقترح الدراسة التالية:


الجزء الأول:

يُمثّل الشكل (أ) من الوثيقة (1) مخططاً يوضح نشاط كل من أنزيم Cox-1 (Cox-1) وأنزيم Cox-2 (Cox-2)، بينما يُبيّن جدول الشكل (ب) من نفس الوثيقة تركيز دواء إيبوبروفان (Ibuprofène) اللازم لخفض نسبة نشاط الأنزيمين السابقين إلى 50% ويعبر عن هذا التركيز بـ (CI_{50}) .

تركيز إيبوبروفان (CI ₅₀)	نوع الأنزيم	
9 ميكرو مول/ل	Cox-1	<p>أنزيم (Cox-2)</p> <p>أنزيم (Cox-1)</p> <p>برستاغلوندين من النمط الثاني (Pg2)</p> <p>برستاغلوندين من النمط الأول (Pg1)</p> <p>التفاعل الأنزيمي</p> <p>تأثير برستاغلوندين</p> <p>يُسبب الحمى والألم (مظاهر الالتهاب)</p> <p>يحفز على إفراز المخاط الذي يحمي الجدار الداخلي للمعدة</p>
10 ميكرو مول/ل	Cox-2	<p>يساهم تناول إيبوبروفان في تفعيل الأنزيم Cox-2، مما يؤدي إلى إنتاج برستاغلوندين من النمط الثاني (Pg2)، مما يُسبب الحمى والألم (مظاهر الالتهاب). في نفس الوقت، يُحفز على إفراز المخاط الذي يحمي الجدار الداخلي للمعدة.</p>
(الشكل (ب))		(الشكل (أ))
(الوثيقة (1))		

1. حل مخطط الشكل (أ) من الوثيقة (1).

2. وضح دور دواء إيبوبروفان مبرزاً أعراضه الجانبية باستغلالك لمعطيات الوثيقة (1).
- الجزء الثاني: يمثل الشكل (أ) من الوثيقة (2) رسومات تخيطية للموقع الفعال لأنزيم Cox-1 (أنزيم (Cox-1)) ولأنزيم Cox-2 (أنزيم (Cox-2)).
- في وجود حمض أراسيدونيك كركيز (S) ودواءين مختلفين (إيبوبروفان وسلوكوكزيب).
- بينما يوضح الشكل (ب) تغيرات النشاط الأنزيمي بدلاًلة تركيز دواء سلكوكزيب.



الشكل (ب)

الوثيقة (2)

الشكل (أ)

1. انطلاقاً من الشكل (أ) من الوثيقة (2) علّ:


- تأثير إيبوبروفان على نفس الأنزيمين.
- تأثير الأنزيمين Cox-1 و Cox-2 على نفس الركيزة.
- 2. فسر منحني الشكل (ب) من الوثيقة (2).
- 3. اقترح حلاً يبيّن كيفية تخفيف الأعراض الجانبية للأدوية التي تستهدف النشاط الأنزيمي.

التمرين الثالث: (08 نقاط)

تُساهم الأجسام المضادة بفعالية في القضاء على الأجسام الغريبة ومع التقدّم البيوتكنولوجي استُعملت كعلاج مناعي (Immunothérapie) لمكافحة سرطان الثدي. فكيف تتدخل الأجسام المضادة في القضاء على هذا النوع من السرطان؟

الجزء الأول:

يُمثل الشكل (أ) من الوثيقة (1) نتائج قياس كمية البروتين الغشائي (Her 2) عند نوعين من الخلايا السرطانية حيث الخلايا (A) مأخوذة من ثدي مصاب والخلايا (B) سرطانية من نوع آخر، بينما يُوضّح الشكل (ب) من نفس الوثيقة عدد هذه الخلايا السرطانية بعد سبعة أيام من الحضن علماً أنّ عدد الخلايا في بداية التجربة كان متساوياً بالنسبة لنوعين من الخلايا.



باستغلالك لنتائج الوثيقة (1):

- 1- استخرج علاقة بروتين (Her 2) بتطور الخلايا السرطانية للثدي.
- 2- اقترح فرضية تُبيّن طريقة علاجية للحد من تكاثر خلايا سرطان الثدي.



الجزء الثاني:


للتأكد من صحة الفرضية المقترحة، أجريت سلسلة من التجارب حيث وضع النوعان من الخلايا السرطانية (A) و (B) في أوساط مختلفة، الشروط والناتج موضحة في الجدول (أ) للوثيقة (2).

بينما يُوضّح الشكل (ب) من الوثيقة (2) العلاقة بين بروتين (Her 2) وجزيء Trastuzumab (جذول (أ) للوثيقة (2)).

كما يُبيّن الشكل (ج) من الوثيقة (2) تطور عدد الخلايا السرطانية (A) بدلالة الزمن قبل وبعد معالجتها.

الحول (أ)	عدد الخلايا السرطانية (بالمليون)	الشروط التجريبية	الوسط
	600	خلايا (A)	1
	200	خلايا (A) + جزيئة Trastuzumab بتركيز 2 ملخ/مل	2
	50	خلايا (A) + جزيئة Trastuzumab بتركيز 20 ملخ/مل	3
	20	خلايا (B)	4
	20	خلايا (B) + جزيئة Trastuzumab بتركيز 20 ملخ/مل	5

الشكل (ب)	خليه سرطانية A في وجود Trastuzumab	خليه سرطانية A في غياب Trastuzumab
	 <p>جزء حيواني جزء بشري جزيء Trastuzumab</p> <p>تثبيت توقف التكاثر</p>	 <p>بروتين لا Her2 التحفيز على التكاثر</p>

الشكل (ج)	الوثيقة (2)
	 <p>عدد الخلايا السرطانية (A) بالمليون</p> <p>الزمن (ساعة)</p> <p>المعالجة بـ Trastuzumab</p> <p>المعالجة بإضافة البالعات</p>

- حل النتائج الموضحة في الحول (أ) من الوثيقة (2).
- فسّر آلية تأثير جزيئة Trastuzumab على الخلايا السرطانية باستغلالك لمعطيات الشكلين (ب) و(ج) من الوثيقة (2) معللا صحة الفرضية المقترحة.
- قدم مقترحا حول إمكانية استغلال نتائج هذه الدراسة في الكشف المبكر عن سرطان الثدي.

الجزء الثالث:

بين من خلال ما سبق ومعلوماتك في نص علمي كيف تتدخل الأجسام المضادة في القضاء على الأجسام الغريبة عموما وخلايا سرطان الثدي على وجه الخصوص.


انتهى الموضوع الأول

الموضوع الثاني

يحتوي الموضوع الثاني على (05) صفحات (من الصفحة 5 من 9 إلى الصفحة 9 من 9)

التمرين الأول: (05 نقاط)

يتوقف الانتقاء النسيلي للمفاويات على مصدر البيبتيد المستضدي المقدم من طرف الخلايا العارضة، وبالتالي يتحدد نمط الاستجابة المناعية النوعية. للتعرف على نمطي الاستجابة تُقترح الوثيقة التالية:




1. سم العناصر المرقمة من 01 إلى 06، ثم تعرف على الخلتين (س) و (ع) ونمطي الاستجابة (أ) و (ب).
2. اكتب نصا علميا تبين فيه دور مصدر المستضد في انتقاء المفاويات وتحديد نمط الاستجابة المناعية النوعية انطلاقا من معطيات الوثيقة ومكتسباتك.

التمرين الثاني: (07 نقاط)

تتأثر عملية تركيب البروتين بعوامل كثيرة، منها ما يعمل على إيقاف تركيبه وفي هذا الإطار يسعى الباحثون إلى استغلال المواد المثبتة لتركيب البروتين في علاج الأورام السرطانية ومن هذه المواد مادة الريسين المستخرجة من بذور نبات الخروع، لمعرفة آلية تأثير مادة الريسين تُقترح عليك الدراسة التالية:
الجزء الأول:

- تمثل الوثيقة (1) نتائج مخبرية لتأثير مادة الريسين حيث:
- يمثل الشكل (أ) من الوثيقة (1) تكاثر الخلايا السرطانية في وجود وغياب مادة الريسين.
- يمثل الشكل (ب) من الوثيقة (1) نتائج متابعة نسبة إدماج التايميدين واللوسين المشعين لعينات من الخلايا السرطانية تم حضنها في تراكيز متزايدة من مادة الريسين.



. حل الوثيقة (1) مبرزاً العلاقة بين تكاثر الخلايا السرطانية المبينة في الشكل (أ) والظواهر الحيوية الموضحة في الشكل (ب).

الجزء الثاني:


1. لتحديد آلية تأثير مادة الريسين على تركيب البروتين يقترح ما يلي:

. الشكل (أ) من الوثيقة (2): يمثل نتائج متابعة نسبة إدماج الاليوريدين المشع لعينات من الخلايا السرطانية تم حضنها في وجود تركيز متزايدة من مادة الريسين.

. الشكل (ب) من نفس الوثيقة: يمثل تطور إدماج الحمض الأميني فينيل ألانين المشع في وسط زرع بحيث:
الوسط الأول: يحتوي على مستخلص خلوي خال من الـ ARNm أضيف له الحمض الأميني فينيل ألانين المشع ومتعدد الاليوريدين.


الوسط الثاني: يحتوي على مستخلص خلوي خال من الـ ARNm أضيف له الحمض الأميني فينيل ألانين المشع وممتعدد الاليوريدين و 0.5 ميكروغرام من مادة الريسين.

ملاحظة: الثلاثية UAU على حامل الشفرة ARNm تُشفّر للحمض الأميني فينيل ألانين.



. حل منحنيات الشكلين (أ) و (ب) مبرزاً المشكلة حول تأثير مادة الريسين على تركيب البروتين.

2. لإظهار آلية تأثير مادة الريسين تُقترح عليك الوثيقة (3).




. أعط حلاً للمشكلة المطروحة انطلاقاً من استغلالك لمعطيات الوثيقة (3).

التمرين الثالث: (08 نقاط)

يتحكم المولود الجديد تدريجياً في حركاته نتيجة تغيرات فيزيولوجية من بينها تلك التي تمسّ المشابك المتبطّة خلال نضج الخلايا العصبية. لمعرفة كيف يتم ذلك تُقترح عليك الدراسة التالية:

الجزء الأول:

تم قياس تغيرات التيار الأيوني والكمون الغشائي على مستوى الغشاء بعد مشبك متبط بعد يوم من الولادة وبعد شهرين من الولادة. النتائج مبنية في الوثيقة (1).



1. حل معطيات الوثيقة (1) محدداً المشكلة العلمية المطروحة.

2. اقترح فرضية لحل هذه المشكلة.


الجزء الثاني:

للتتحقق من صحة الفرضية المقترحة أجريت الدراسة الممثلة في الوثيقة (2) حيث:

. الشكل (أ): يُبيّن توضع بعض البروتينات في الغشاء بعد مشبك متبط في نوعين من مضخات شوارد الكلور (Cl⁻) (NKCC1 و KCC2) بالإضافة إلى المستقبلات القنوية لـ GABA.

. الشكل (ب): يُمثل تغيرات التركيز الداخلي لشوارد الكلور (Cl^-) خلال 60 يوماً بعد الولادة.

. الشكل (ج): يُمثل تطور كمية (ARNm) للبروتينات الغشائية (NKCC1) و(KCC2) خلال 60 يوماً بعد الولادة.



1. استخرج أهم مميزات البروتينات الغشائية الممثلة في الشكل (أ) من الوثيقة (2).

2. تأكّد من صحة الفرضية المقترحة باستغلالك لمعطيات الوثيقة (2).

3. قدم حلاً مبنّياً على أساس علمية لعلاج أشخاص بالغين يعانون من اضطرابات عصبية ناتجة عن تراكم شوارد الـ (Cl^-) في هيولى الخلية بعد مشبكية.

الجزء الثالث:

لِخَص في نص علمي دقيق آلية عمل المشبك المثبت عند شخص سليم بالغ مبرزاً دور مختلف البروتينات الغشائية في ذلك باستغلالك لنتائج الدراسة السابقة ومكتسباتك.

انتهى الموضوع الثاني

العلامة المجموع مجراً	عنصر الإجابة (الموضوع الأول)	التمرين الأول (٥٥ نقاط) (١)						
		كل بيانين ٠.٢٥ x ١١) (٠.٢٥ ملاحظة: بالنسبة لبيانين ٦ و ٣ تمنح ٠.٢٥ لكلهما إذا ذكر فقط ليتوسفير	٥ . رداء ليتوسفيري محيطية	٤ . قشرة قاري	٣ . ليتوسفير قاري	٢ . رداء (برنس) ليتوسفيري	١ . قشرة قارية	أسماء البيانات المرقمة
٢.٧٥	١٠ . نواة داخلية خارجية	٩ . نواة خارجية	٨ . الرداء السفلي	٧ . أستينوسفير محطي	٦ . ليتوسفير محطي	٥ . سائل صلب	٤ . صلب	الحالة الفيزيائية (صلب، لدن، سائل)
	٤ . غابرو ن قبل بازلت (صخر مميز للطبقة رغم أنه ليس اندساسياً)	٢ . بيريدوتيت		١ . غرانيت				الصخر الاندساسى المميز
	C . ليمان	B . غوتبرغ	A . موهو					اسم الانقطاع
								(٢) النص العلمي:
٢.٢٥	<table border="1"> <thead> <tr> <th>المعايير</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> • اختلاف سرعة انتشار الموجات (P) و (S) داخل الكرة الأرضية والذي يتوقف على الطبيعة الكيميائية والحالة الفيزيائية للمادة التي تخترقها. • تنتشر الموجات (P) في الأوساط السائلة والصلبة • تنتشر الموجات (S) فقط في الأوساط الصلبة وجود ٥ انقطاعات: • انقطاع موهو يفصل بين القشرة والبرنس • طبقة LVZ تفصل بين الليتوسفير والأستينوسفير. • انقطاع يفصل بين الاستينوسفير والمعطف السفلي • انقطاع غوتبرغ يفصل بين برنس (صلب) والنواة (طبقتها الخارجية على الأقل سائلة). • انقطاع ليمان يفصل بين النواة الخارجية والنواة الداخلية. </td> </tr> </tbody> </table>	المعايير	<ul style="list-style-type: none"> • اختلاف سرعة انتشار الموجات (P) و (S) داخل الكرة الأرضية والذي يتوقف على الطبيعة الكيميائية والحالة الفيزيائية للمادة التي تخترقها. • تنتشر الموجات (P) في الأوساط السائلة والصلبة • تنتشر الموجات (S) فقط في الأوساط الصلبة وجود ٥ انقطاعات: • انقطاع موهو يفصل بين القشرة والبرنس • طبقة LVZ تفصل بين الليتوسفير والأستينوسفير. • انقطاع يفصل بين الاستينوسفير والمعطف السفلي • انقطاع غوتبرغ يفصل بين برنس (صلب) والنواة (طبقتها الخارجية على الأقل سائلة). • انقطاع ليمان يفصل بين النواة الخارجية والنواة الداخلية. 	<p>الموارد الأساسية التي يتضمنها النص العلمي</p>				
المعايير								
<ul style="list-style-type: none"> • اختلاف سرعة انتشار الموجات (P) و (S) داخل الكرة الأرضية والذي يتوقف على الطبيعة الكيميائية والحالة الفيزيائية للمادة التي تخترقها. • تنتشر الموجات (P) في الأوساط السائلة والصلبة • تنتشر الموجات (S) فقط في الأوساط الصلبة وجود ٥ انقطاعات: • انقطاع موهو يفصل بين القشرة والبرنس • طبقة LVZ تفصل بين الليتوسفير والأستينوسفير. • انقطاع يفصل بين الاستينوسفير والمعطف السفلي • انقطاع غوتبرغ يفصل بين برنس (صلب) والنواة (طبقتها الخارجية على الأقل سائلة). • انقطاع ليمان يفصل بين النواة الخارجية والنواة الداخلية. 								

	025. ²	<p>. تتزايد سرعة الموجات الزلزالية بزيادة كثافة الوسط الذي تخترقه .</p> <p>. كل تغير في سرعة الموجات الزلزالية يدل على وجود انقطاع</p> <p>مقدمة تتضمن مشكلة.</p> <p>العرض يتضمن الموارد الأساسية</p> <p>الخاتمة: سمحت هذه الدراسات ببناء نموذج تصوري يعرض لبنية الكرة الأرضية مكونة من عدة أغلفة متعددة المركز تفصلها انقطاعات.</p>	الربط بين الموارد
--	-------------------	---	-------------------

العلامة	عناصر الإجابة (الموضوع الأول)		
Mجموعه	مجازأة		
1.5	0.5	<p>التمرين الثاني (07 نقاط):</p> <p>الجزء الأول:</p> <p>1) تحليل الشكل (أ) من الوثيقة (1): نكتفي بالتحليل بذكر ما يلي:</p> <p>يُمثل الشكل (أ) مخطط يوضح تأثير الأنزيمين (Cox-1) و (Cox-2) بحيث:</p> <ul style="list-style-type: none"> يُحول إنزيم Cox-1 حمض أراشيدونيك إلى برستاغلوندين من النمط الأول الذي يُحفز على إفراز المخاط لحماية الجدار الداخلي للمعدة. يُحول إنزيم Cox-2 حمض أراشيدونيك إلى برستاغلوندين من النمط الثاني الذي يُسبب الحمى والألم. <p>الاستنتاج: الأنزيمين (Cox-1) و (Cox-2) يؤثران على نفس الركيزة ويختلفان في نوعية التأثير عليها (التأثير النوعي المزدوج).</p>	
02	1	<p>2) توضيح دور دواء إيبوبروفان وإبراز أعراضه الجانبية:</p> <ul style="list-style-type: none"> يُستخدم دواء إيبوبروفان كمضاد للالتهاب لأنه يُثبط إنزيم Cox-2 مسبباً اختفاء الحمى والألم. غير أن له أعراضًا جانبية ناتجة عن تثبيطه لأنزيم Cox-1 مما ينقص من إفراز المخاط الواقي للجدار الداخلي للمعدة. 	1

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الأول)
مجموعة	مجازأة	
1.5	0.75 0.75	<p>الجزء الثاني: (1) التعليل:</p> <ul style="list-style-type: none"> - تأثير الأنزيمين (Cox-1) و(Cox-2) على نفس الركيزة يُعلّق بتشابه البنية الفراغية للموقع الفعال للأنزيمين مما يسمح بتثبيت نفس الركيزة (حمض أراشيدونيك). - يؤثر إيبوبروفان على نفس الأنزيمين لأن له بنية فراغية شبيهة ببنية الركيزة تمكّنه من الارتباط بالموقع الفعال لكلا الأنزيمين.
01	0.5 0.5	<p>(2) تفسير منحنى الشكل (ب) من الوثيقة (2):</p> <p>يكون نشاط أنزيم Cox-1 بطيءاً إذ يصل CI_{50} عند 9 ميكرو مول/ل وينعد نشاطه عند 10 ميكرو مول/ل، يرجع ذلك لضعف ارتباط هذا الدواء مع الموقع الفعال للأنزيم.</p> <p>غير أن نشاط أنزيم Cox-2 ينخفض بشكل سريع وشديد، إذ يصل $CI_{50} = 0,9$ ميكرو مول/ل إلى أن يكاد ينعدم ابتداء من 2 ميكرو مول/ل و يرجع ذلك إلى قوة ارتباط دواء سلوكوزيب بالموقع الفعال لوجود تكامل بنوي عال معه.</p>
01	1 في الحالة الحلول الأخرى تنبع نصف العلامة	<p>(3) الحل المقترن:</p> <ul style="list-style-type: none"> - أن تكون الأدوية المستهدفة لنشاط أنزيم ما لا تؤثر على نشاط أنزيم آخر حول أخرى مثلاً: - عدم تناول الدواء إلا باستشارة الطبيب - التقليل من استهلاك الأدوية، الخ. <p>ملاحظة: يقبل كل حل مرتبط بالسياق (دواء ناجع مع أعراض جانبية محدودة)</p>
01	0.25 0.25 0.5	<p>التمرين الثالث (08 نقاط):</p> <p>الجزء الأول:</p> <p>(1) استخراج علاقة بروتين (Her 2) بتطور الخلايا السرطانية للثدي:</p> <p>من الشكل (أ): ثُرَكِبَ الخلايا (A) كميات كبيرة من بروتين (Her 2) بينما ثُرَكِبَ الخلايا (B) كميات ضئيلة منه.</p> <p>من الشكل (ب): بعد سبعة أيام من الزرع يلاحظ تزايداً كبيراً في عدد الخلايا (A) مقارنة بعدد الخلايا (B).</p> <p>العلاقة: زيادة إنتاج بروتين (Her 2) يرفع من سرعة تكاثر الخلايا (A) السرطانية.</p>

01	01	<p>(2) اقتراح فرضية ثبّين طريقة علاجية:</p> <p>للحد من تكاثر خلايا هذا النمط من سرطان الثدي تستعمل مواد تثبط بروتين (Her 2). ملاحظة: تقبل كل فرضية تشير إلى استهداف بروتين (Her 2).</p>
0.75	0.5	<p>الجزء الثاني:</p> <p>1) تحليل النتائج الموضحة في الجدول (أ) من الوثيقة (2):</p> <p>تمثل الوثيقة نتائج تطور عدد الخلايا السرطانية A و B في غياب وفي وجود تراكيز مختلفة لتراستوزوماب.</p> <p>في غياب تراستوزوماب يكون عدد الخلايا السرطانية A مرتفعاً إذ يصل إلى 600 مليون بينما عدد الخلايا B يكون منخفضاً جداً، مما يدل على وجود إفراط في تكاثر الخلايا السرطانية A.</p> <p>في وجود تراستوزوماب بتركيز 2 ملغم/مل نسجل انخفاضاً كبيراً في عدد الخلايا السرطانية A إلى 200 مليون خلية وعند تركيز 20 ملغم/مل ينخفض عدد الخلايا A إلى 50 مليون خلية أي كلما زاد تركيز تراستوزوماب نقص عدد الخلايا السرطانية.</p> <p>بينما يبقى عدد الخلايا B ثابتاً، مما يدل على أن تراستوزوماب يؤثر على الخلايا السرطانية A ولا يؤثر على الخلايا السرطانية B.</p> <p>ومنه نستنتج أن تراستوزوماب يحد من تكاثر الخلايا السرطانية A.</p>
2.25	0.5	<p>2) تفسير آلية تأثير جزيئة (Trastuzumab) على الخلايا السرطانية مع تعليم صحة الفرضية المقترحة:</p> <p>-من الشكل (ب): ترتبط مادة تراستوزوماب نوعياً بالبروتين الغشائي (Her 2) وتوقف تحفيزه للخلايا السرطانية على التكاثر.</p> <p>-من الشكل (ج):</p> <p>قبل المعالجة: نسجل تزايداً سريعاً في عدد الخلايا السرطانية (A)، لغياب الأجسام المضادة.</p> <p>بعد المعالجة بالأجسام المضادة: نلاحظ انخفاضاً تدريجياً في عدد الخلايا السرطانية (A).</p> <p>نتيجة الارتباط النوعي للأجسام المضادة بـ (Her 2) فيقل عدد (Her 2) الحر مما يُحَفِّظُ من سرعة تكاثر الخلايا السرطانية A.</p> <p>بعد المعالجة بالبالعات نسجل انخفاضاً سريعاً في عدد الخلايا السرطانية (A) حتى ينعدم نتيجة تنشيط البالعات التي تملك مستقبلات غشائية نوعية ترتبط مع الأجسام المضادة لتسهيل بلعمة الخلايا السرطانية.</p> <p>ومنه يمكن المصادقة على صحة الفرضية التي تنص على استهداف الأجسام المضادة لـ (Her 2)</p>

<p>01</p> <p>01</p>	<p>(3) تقديم مقترن حول إمكانية استغلال نتائج هذه الدراسة في الكشف المبكر عن سرطان الثدي: يمكن الكشف المبكر عن سرطان الثدي بتحديد كمية (Her 2) في الخلايا السرطانية بتقنية الوسم المناعي عن طريق الأجسام المضادة (أو تراستوزوماب) المفلورة.</p> <p>قبل الاقتراحات:</p> <ul style="list-style-type: none"> . استغلال المؤشر الذات على كثافة (Her 2)، وذلك لتغير كميته خلال مراحل المرض.
<p>02</p> <p>0.25</p> <p>0.25×4</p>	<p>الجزء الثالث: تتضمن الإجابة تركيباً للمعلومات الأساسية التالية:</p> <ul style="list-style-type: none"> . تدخل الأجسام المضادة في القضاء على الأجسام الغريبة بشكل عام. - تستجيب العضوية بإنتاج أجسام مضادة للأجسام الغريبة قصد القضاء عليها، فكيف تسهم هذه الجزيئات في إقصاء الأجسام الغريبة بما في ذلك سرطان الثدي؟ - الأجسام المضادة جزيئات ذات طبيعة بروتينية تتنمي إلى مجموعة الغلوبيلينات المناعية من نوع (γ) غلوبيلين. - يرتبط الجسم المضاد بالمستضد ارتباطاً نوعياً نتيجة التكامل البنيوي بين محددات المستضد وموقع تثبيت خاص بها على مستوى الجسم المضاد، يؤدي تشكيل المعقد المناعي إلى إبطال مفعول المستضد. - يتم التخلص من المعقدات المناعية بعملية البلعمة حيث يتثبت المعقد المناعي على المستقبلات الغشائية التوعية للبالغات الكبيرة بفضل التكامل البنيوي بين هذه المستقبلات وموضع تثبيت خاص يوجد في مستوى الجزء الثابت من الجسم المضاد مما يسمح باقتناص المعقد المناعي وتخريبه بواسطة الأنزيمات الحالة فتشكل المعقد المناعي يُسرع من عملية الاقتراض. <p>تدخل الأجسام المضادة في القضاء على الخلايا السرطانية (من هذا النمط من سرطانات الثدي)</p> <ul style="list-style-type: none"> . تمنع الأجسام المضادة تكاثر خلايا سرطان الثدي نتيجة تعطيل (Her2) حيث تشكّل معقدات مناعية تسرع تدخل البالغات في القضاء على الخلايا السرطانية. - إذن يمكن تطوير أجسام مضادة تستهدف أنواعاً أخرى من البروتينات الغشائية التي تميّز مختلف السرطانات.

العلامة	عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)													
مجموعه	مجزأة													
2.50	6x0.25 2x0.25 2x0.25	<p>الثمرتين الأول (05 نقاط):</p> <p>(1) - كتابة البيانات المرقمة من 01 إلى 06 : 1: بروتين مستضدي ، 2: مستضد ، 3: معقد (CMHI - بببتيد مستضدي) 4: معقد (CMHII - بببتيد مستضدي) ، 5: LT8 ، 6: LT4</p> <p>- التعرف على الخلتين:</p> <p>الخلية (س): خلية مصابة (مستهدفة). الخلية (ع): بلعمية أو بالعنة كبيرة (ماكروفاج أو CPA)</p> <p>- التعرف على نمطي الاستجابة:</p> <p>* نمط الاستجابة (أ): استجابة مناعية ذات وساطة خلوية. * نمط الاستجابة (ب): استجابة مناعية ذات وساطة خلطية</p>												
2.50	x7 0.25 0.25 0.5	<p>(2) النص العلمي:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>المعايير</th> <th>الموارد التي يتضمنها النص العلمي</th> <th>الربط بين الموارد والهيكلة التنظيمية</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> . تركيب جزيئات CMHI على مستوى الشبكة الهيولية الفعالة . تُقدم البروتينات الفيروسية، بروتينات الخلايا السرطانية... على سطح أغشية الخلايا العارضة مرتبطة بجزيئات الـ CMHI إلى الخلايا LT8. . تشيط الاستجابة المناعية ذات وساطة خلوية . بلعنة المستضد، هضمه جزئياً، تركيب بجزيئات الـ CMHIII - يرتبط محدد المستضد بجزيئات CMHIII على مستوى الليزوزوم - تُقدم البببتيدات مرتبطة بجزيئات CMHII إلى الخلايا LT4 . تشيط الاستجابة المناعية ذات وساطة خلطية. </td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> . الربط بين نوع CMH و الخلايا المنشطة وطبيعة الاستجابة المناعية </td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> <p>مقدمة تتضمن مشكلة يتسبب دخول مولد الضد في الخلايا المصابة أو في الخلايا العارضة في اختيار نمط الاستجابة المناعية النوعية.</p> <p>العرض يتضمن الموارد الأساسية</p> <p>الخاتمة: عرض الببتيد المستضدي يحدد نمط الاستجابة المناعية التي تضمن إقصاء المستضد.</p> </td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	المعايير	الموارد التي يتضمنها النص العلمي	الربط بين الموارد والهيكلة التنظيمية	<ul style="list-style-type: none"> . تركيب جزيئات CMHI على مستوى الشبكة الهيولية الفعالة . تُقدم البروتينات الفيروسية، بروتينات الخلايا السرطانية... على سطح أغشية الخلايا العارضة مرتبطة بجزيئات الـ CMHI إلى الخلايا LT8. . تشيط الاستجابة المناعية ذات وساطة خلوية . بلعنة المستضد، هضمه جزئياً، تركيب بجزيئات الـ CMHIII - يرتبط محدد المستضد بجزيئات CMHIII على مستوى الليزوزوم - تُقدم البببتيدات مرتبطة بجزيئات CMHII إلى الخلايا LT4 . تشيط الاستجابة المناعية ذات وساطة خلطية. 			<ul style="list-style-type: none"> . الربط بين نوع CMH و الخلايا المنشطة وطبيعة الاستجابة المناعية 			<p>مقدمة تتضمن مشكلة يتسبب دخول مولد الضد في الخلايا المصابة أو في الخلايا العارضة في اختيار نمط الاستجابة المناعية النوعية.</p> <p>العرض يتضمن الموارد الأساسية</p> <p>الخاتمة: عرض الببتيد المستضدي يحدد نمط الاستجابة المناعية التي تضمن إقصاء المستضد.</p>		
المعايير	الموارد التي يتضمنها النص العلمي	الربط بين الموارد والهيكلة التنظيمية												
<ul style="list-style-type: none"> . تركيب جزيئات CMHI على مستوى الشبكة الهيولية الفعالة . تُقدم البروتينات الفيروسية، بروتينات الخلايا السرطانية... على سطح أغشية الخلايا العارضة مرتبطة بجزيئات الـ CMHI إلى الخلايا LT8. . تشيط الاستجابة المناعية ذات وساطة خلوية . بلعنة المستضد، هضمه جزئياً، تركيب بجزيئات الـ CMHIII - يرتبط محدد المستضد بجزيئات CMHIII على مستوى الليزوزوم - تُقدم البببتيدات مرتبطة بجزيئات CMHII إلى الخلايا LT4 . تشيط الاستجابة المناعية ذات وساطة خلطية. 														
<ul style="list-style-type: none"> . الربط بين نوع CMH و الخلايا المنشطة وطبيعة الاستجابة المناعية 														
<p>مقدمة تتضمن مشكلة يتسبب دخول مولد الضد في الخلايا المصابة أو في الخلايا العارضة في اختيار نمط الاستجابة المناعية النوعية.</p> <p>العرض يتضمن الموارد الأساسية</p> <p>الخاتمة: عرض الببتيد المستضدي يحدد نمط الاستجابة المناعية التي تضمن إقصاء المستضد.</p>														

العلامة	عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)
مجموعه	مجزأة
	<p>التمرين الثاني: (07 نقاط) الجزء الأول: تحليل الوثيقة</p> <p>يمثل الشكل (أ) تطور الخلايا السرطانية في غياب وفي وجود مادة الريسين بتركيز 10 ميكروغرام/مل - في غياب مادة الريسين نلاحظ تكاثر الخلايا السرطانية بشكل كثيف وعشوائي. - في وجود مادة الريسين بتركيز 10 ميكروغرام/مل نلاحظ تكاثر الخلايا السرطانية بشكل ضعيف ومنتظم.</p> <p>الاستنتاج: مادة الريسين ترتبط (أو يحد) تكاثر الخلايا السرطانية.</p> <p>يمثل الشكل (ب) نتائج متابعة نسبة إدماج كل من التايمدين واللوسين المشعين لعينات من الخلايا السرطانية تم حضنها في غياب وفي وجود تراكيز متزايدة من مادة الريسين.</p> <p>- في غياب مادة الريسين نلاحظ دمج كل من التايمدين واللوسين المشعين بنسبة 100% من طرف الخلايا السرطانية.</p> <p>- في وجود مادة الريسين وبتركيز متزايدة حتى 10 ميكروغرام /مل، تقل نسبة دمج التايمدين المشع في ADN إلى 55% واللوسين المشع في البروتين المتشكل إلى 20% من طرف الخلايا السرطانية .</p> <p>الاستنتاج: مادة الريسين ترتبط تركيب البروتين وبالتالي تضاعف ADN في الخلايا السرطانية.</p> <p>الربط بين تكاثر الخلايا السرطانية والظواهر الحيوية:</p> <p>. تركيب البروتين يسمح بتضاعف ADN وبالتالي تتكاثر الخلايا السرطانية.</p>
3.50	<p>الجزء الثاني: 1) تحليل المنحنيات وإبراز المشكلة:</p> <p>*يمثل الشكل (أ) تطور نسبة دمج الاليوريدين بدلالة تغير تركيز مادة الريسين حيث نلاحظ ثبات نسبة دمج الاليوريدين المشع عند قيمة أعظمية بنسبة 100% مهما زاد تركيز الريسين.</p> <p>الاستنتاج: الريسين لا يؤثر على دمج الاليوريدين وبالتالي لا يمنع عملية الاستنساخ.</p> <p>*يمثل الشكل (ب) تطور ادماج الحمض الأميني فينيل الألين المشع بدلالة الزمن حيث: في غياب مادة الريسين وإضافة متعدد الاليوريدين مع الفينيل الألين المشع نلاحظ دمج الفينيل الانين</p>

			في متعدد الفينيل ألانين وتزداد كمية الدمج مع الزّمن. - في وجود مادة الرّيسين وإضافة متعدد البيريدين مع الفينيل ألانين نلاحظ دمج طفيف للفينيل ألانين يمكن إهماله.
2.5	0.25 0.50 0.75		الاستنتاج: تعيق مادة الرّيسين تركيب البروتين من خلال <u>إعاقة</u> عملية التّرجمة. *إبراز المشكل: إذا كانت مادة الرّيسين لا تؤثر على عملية الاستساخ وتعيق عملية التّرجمة فما مستوى تأثيرها؟ كيف يؤثر الرّيسين على آلية التّرجمة؟
01	0.25 0.75		(2) تقديم حل للمشكلة باستغلال الوثيقة (3) - في غياب مادة الرّيسين يتشكل ريبوزوم وظيفي وتم عملية التّرجمة ويترکب البروتين. - في وجود مادة الرّيسين لا يتشكل ريبوزوم وظيفي فلا تتم عملية التّرجمة ولا يتم تركيب البروتين حيث تثبت مادة الرّيسين على الد ARNr (28s) تحت الوحدة الـ <u>الريبوzومية الكبـرى</u> مما يمنع تشكـل ريبوزوم وظيفي وهذا يعيق عملية التّرجمة فلا يتم تركيب البروتين.
1.75	01		التمرـين الثالث: (08 نقاط) الجزء الأول: (1) تحلـيل الوثـيقة (1): تمثل الوثـيقة رسـومات تخطـيطـية لـمشـبك مـثـبط وـنتـائـج قـيـاس تـغـيـرات التـيـار الأـيـونـي والـكمـونـ الغـشـائي لـالـغـشـاء بـعـد المشـبـكـي فـي الـيـوم الأـوـل وـبـعـد 60 يـوم مـن الـولـادـة حـيـث: ـ فـي الـيـوم الأـوـل مـن الـولـادـة: يـؤـدي تـبـيـه الـنـهـاـيـة قـبـل المشـبـكـي إـلـى تـحرـير الدـ GABA وـتـبـيـهـ على المستـقبـلاتـ الـقـنـوـيـةـ فـتـدـفـقـ شـوـارـدـ الدـ Clـ نحوـ الـخـارـجـ فـسـجـلـ تـيـارـ أـيـونـيـاـ خـارـجاـ يـؤـديـ إـلـى زـوـالـ استـقطـابـ الـغـشـاءـ بـعـدـ المشـبـكـيـ (ـتـولـيدـ PPSEـ). ـ بـعـدـ 60 يـومـ مـنـ الـولـادـة:ـ يـؤـديـ تـبـيـهـ الـنـهـاـيـةـ قـبـلـ المشـبـكـيـ إـلـىـ تـحرـيرـ الدـ GABAـ وـتـبـيـهـ علىـ المستـقبـلاتـ الـقـنـوـيـةـ مـسـبـباـ تـدـفـقـ شـوـارـدـ الدـ Clـ نحوـ الـذـاـخـلـ فـمـسـجـلـ تـيـارـ أـيـونـيـاـ دـاخـلاـ يـؤـديـ إـلـى فـرـطـ فيـ استـقطـابـ الـغـشـاءـ بـعـدـ المشـبـكـيـ (ـتـولـيدـ PPSIـ). ـ الـاستـنـتـاجـ:ـ يـطـرـأـ عـلـىـ مشـبـكـ الدـ GABAـ تـحـولـ فـيـزـيـولـوـجـيـ مـنـ مشـبـكـ منـبـهـ إـلـىـ مشـبـكـ مـثـبطـ خـالـلـ المـراـحلـ الـأـوـلـىـ مـنـ الـولـادـةـ. ـ الـمـشـكـلـ الـعـلـمـيـ:ـ كـيـفـ يـفـسـرـ تـغـيـرـ اـتجـاهـ تـدـفـقـ شـوـارـدـ الدـ Clـ عـلـىـ مـسـتـوىـ المشـبـكـ قـبـلـ وـبـعـدـ التـغـيـراتـ الـفـيـزـيـولـوـجـيـةـ؟ـ ـ مـلـاحـظـةـ:ـ تـقـبـلـ صـيـاغـاتـ أـخـرىـ لـالـمـشـكـلـ الـعـلـمـيـ تـصـبـ فـيـ نـفـسـ السـيـاقـ. ـ مـثالـ:ـ كـيـفـ نـفـسـ أـثـرـ الدـ GABAـ عـلـىـ تـدـفـقـ شـوـارـدـ الـكـلـورـ عـلـىـ مـسـتـوىـ المشـبـكـ قـبـلـ وـبـعـدـ التـغـيـراتـ الـفـيـزـيـولـوـجـيـةـ؟ـ

		(2) اقتراح فرضية:
0.75	0.75	<p>. قبل النضج: تتدخل آلية تحدث تراكم شوارد Cl^- في الداخل، تثبيت GABA على المستقبلات المرتبطة بالكيماء يسمح بتدفق لشوارد Cl^- حسب تدرج التركيز نحو الخارج محدثا زوال الاستقطاب.</p> <p>. بعد النضج: تتدخل آلية تحدث تراكم شوارد Cl^- في الخارج، تثبيت GABA على المستقبلات المرتبطة بالكيماء يسمح بتدفق لشوارد Cl^- حسب تدرج التركيز نحو الداخل محدثا افراط في الاستقطاب.</p>
01	0.5 0.25 0.25	<p>الجزء الثاني:</p> <p>1) استخراج أهم مميزات البروتينات الغشائية الممثلة في الشكل (أ) من الوثيقة (2):</p> <ul style="list-style-type: none"> - مستقبلات GABA_A المنشطة بـ GABA تعمل وفق تدرج التركيز (ظاهرة الميز). - NKCC1 بروتين ضمني يلعب دور مضخة تعمل على إدخال شوارد Cl^- عكس تدرج التركيز بظاهرة النقل الفعال. - KCC2 بروتين ضمني يلعب دور مضخة تعمل على إخراج شوارد Cl^- عكس تدرج التركيز بظاهرة النقل الفعال.
02	0.50 0.50 0.50	<p>(2) التأكيد من صحة الفرضية المقترحة باستغلال معطيات الوثيقة (2):</p> <p>الشكل (أ):</p> <ul style="list-style-type: none"> - في اليوم الأول من الولادة يتميز الغشاء بعد المشبك بتوارد مضخات NKCC1 التي تضخ شوارد Cl^- نحو الداخل، تنشيط مستقبلات القنوية لا GABA_A يسمح بتدفق شوارد Cl^- نحو الخارج. - في اليوم 60 من الولادة يتميز الغشاء بعد المشبك بتوارد مضخات KCC2 التي تضخ شوارد Cl^- نحو الخارج، تنشيط مستقبلات القنوية لا GABA_A يسمح بتدفق شوارد Cl^- نحو الداخل. <p>الشكل (ب): - من اليوم الأول إلى اليوم 15 بعد الولادة يتزايد التركيز الداخلي لشوارد Cl^- من (2 وт) لتصل قيمة عظمى (3 وт).</p> <p>- من اليوم 15 إلى اليوم 40 بعد الولادة ينخفض التركيز الداخلي لشوارد Cl^- تدريجيا من (3 وт) ليصل قيمة دنيا (1 وт)،</p> <p>- من اليوم 40 إلى اليوم 60 بعد الولادة ثبات التركيز الداخلي لشوارد Cl^- عند القيمة (1 وт).</p> <p>الشكل (ج): - عند الولادة: تقدر نسبة تعبير ARN_m الخاص بـ NKCC1 بـ (1 وт) بينما تكون نسبة تعبير ARN_m الخاص بـ KCC2 معروفة.</p> <p>- من اليوم الأول إلى اليوم 5: تزايد نسبة تعبير ARN_m الخاص بـ NKCC1 بمقدار الضعف لتصل إلى قيمة عظمى (2 وт) بينما يسجل تزايد ضئيل في نسبة تعبير ARN_m الخاص بـ KCC2.</p>

		<p>- من اليوم 5 إلى اليوم 15: انخفاض نسبة تعبير الـ ARN_m الخاص بـ $\text{NKCC}1$ من (2 وт) إلى (0,5 وт) بينما يستمر تزايد نسبة تعبير الـ ARN_m الخاص بـ $\text{KCC}2$ لتصل إلى قيمة عظمي تقدر بـ (1,5 وт).</p> <p>- من اليوم 15 إلى اليوم 60: استمرار انخفاض نسبة تعبير الـ ARN_m الخاص بـ $\text{NKCC}1$ حتى تتعدى بينما تثبت نسبة تعبير الـ ARN_m الخاص بـ $\text{KCC}2$ عند القيمة الأعظمية (1,5 وт). ومنه: خلال الأيام الأولى من الولادة يكون التعبير المورثي لـ $\text{NKCC}1$ عاليًا مما يؤدي إلى تركيب مضخات $\text{NKCC}1$ المسئولة عن ضخ شوارد (Cl^-) نحو الداخل فيرتفع تركيز (Cl^-) الداخلي، ولذا تثبت الـ GABA على المستقبلات القنوية يُسبب خروج شوارد (Cl^-) عبرها محدثة زوال في الاستقطاب (تأثير تتبيلي).</p> <p>في اليوم 60 بعد الولادة يكون التعبير المورثي لـ $\text{KCC}2$ عاليًا مما يؤدي إلى تركيب مضخات $\text{KCC}2$ المسئولة عن ضخ شوارد (Cl^-) نحو الخارج فينخفض تركيز (Cl^-) الداخلي، ولذا تثبت الـ GABA على المستقبلات القنوية يُسبب دخول شوارد (Cl^-) عبرها محدثة فرط في الاستقطاب (تأثير تتبيلي) وبذلك ينضج المشبك التثبيطي. وهذا يؤكد صحة الفرضية المقترحة سابقا.</p>
0.50	0.50	<p>(3) حل مبني على أساس علمية لعلاج أشخاص بالعين يعانون من اضطرابات عصبية ناتجة عن تراكم شوارد (Cl^-) في هيولى الخلية بعد مشبكية:</p> <ul style="list-style-type: none"> . استعمال مواد كيميائية مثبطة عمل مضخات NKCC. . استعمال أدوية تنشط عمل مضخات $\text{KCC}2$.
02	0.5 ×6 0.25	<p>الجزء الثالث: النص العلمي: تتضمن الإجابة تركيباً للمعلومات الأساسية التالية:</p> <p>للمشبكات التثبيطية دور كبير في العمل المنسق للجهاز العصبي خلال مراقبته لمختلف وظائف الجسم وذلك بتدخل بروتينات غشائية عالية التخصص.</p> <p>فكيف تتدخل البروتينات الغشائية في آلية عمل المشبك المثبطة؟</p> <ul style="list-style-type: none"> . تخرج مضخات $\text{KCC}2$ شوارد (Cl^-) فتراكم على سطح الخلايا العصبية. . وصول الرسالة العصبية إلى الزر المشبكي يؤدي إلى افتتاح القنوات الفولطية للكالسيوم. . دخول الكالسيوم إلى هيولى الخلية قبل المشبكية يحفز تحرير الـ GABA في الشق المشبكي. . تثبت الـ GABA على مستقبلاته القنوية النوعية يؤدي إلى افتتاحها ودخول شوارد (Cl^-). . يُسبب التدفق الداخلي لـ (Cl^-) فرطاً في استقطاب الخلية بعد المشبكية مولداً PPSI. . تخرج مضخات $\text{KCC}2$ من جديد شوارد (Cl^-) لتعيد تراكيزها إلى حالتها الأصلية (درج التركيز).