

d'effort

E

- ✓ à l'effort
- ✓ lors d'une poussée abd
 - toux, - marche, - rire
 - en position de bout
- ✓ Vidange vésicale incomplète

Incontinence Urinaire (I U)

Perte d'urines

- involontaire
- en dehors des mictions
- par l'urètre

par urgencie

U

- lors d'un besoin urgent
- fréquemment associée à une pollakiurie

Urétre

- hyper mobilité
- insuffisance sphinctérienne

Vesicule

- Hyperactivité du détrusor
- ↓ compliance vésicale

Démarche Diagnostique

Interrogatoire :

Définition

Calendrier mictionnel

Retraçage psychosocial

Bilan étiologique :

effort, poussée abdominale




← CDD → ↗ impérativité / urgencie

CDD

FdR

Ura

Ura</h4



Mécanisme

Urgenturie

Hyperactivité du détrusor

F.f.
Etiologie
Reeducat des OS

Chirurgie

Toxine boutulique
Neuro modulation sacrée

Compliance

Anti cholinergiques

Hydro dilatation
CSTE A

Effort

Insuffisance sphinctérienne

Sphincter artificiel
Balon péri urethrae

Hypermobilité urétrale

Colpo-suspension Burch
Bandlette sous uretrale