



Epreuve de Moyenne Durée

Le : 01/03/2018 – Durée 1h 30mn – Document autorisé : série 2

Exercice 1 : (4 pts)

Dire, en justifiant, si les formules suivantes sont des tautologies ? si elles sont satisfiables ?

- a) $(\neg A \vee B) \rightarrow (A \wedge \neg B)$ (1 pt)
- b) $(A \vee B) \rightarrow ((A \rightarrow C) \rightarrow ((B \rightarrow C) \rightarrow C))$ (1 pt)
- c) $((A \rightarrow B) \wedge C) \rightarrow \neg C \rightarrow (A \rightarrow \neg B)$ (1 pt)
- d) Si « $1+1 = 3$ » alors « $1+1 = 2$ » (1 pt)

Exercice 2 : (4 pts)

Quatre internautes A, B, C et D sont sortis de cybercafés, et ont fait chacun une déclaration :

- A : « J'ai chaté avec B et C et D » ; (chater = discuter en ligne)
- B : « J'ai chaté avec A et C mais pas avec D » ;
- C : « J'ai chaté avec A et B mais pas avec D » ;
- D : « J'ai chaté avec B mais pas avec A ni avec C ».

Sachant que chaque internaute a menti une et une seule fois dans sa déclaration, et que B a chaté avec D et aussi que C n'a pas chaté avec D, qui a réellement chaté avec qui ?

Exercice 3 : (7 pts)

I) Soient les formules propositionnelles suivantes (dont on veut prouver la validité à l'aide de la méthode axiomatique) : $F1 \equiv (B \rightarrow (\neg A \rightarrow \neg B)) \rightarrow (B \rightarrow A)$

$$F2 \equiv (C \rightarrow ((A \rightarrow (C \rightarrow B)) \rightarrow B)) \rightarrow (C \rightarrow (\neg A \rightarrow B))$$

I-1) Montrer que F1 et F2 sont des théorèmes ; en utilisant des hypothèses (application du théorème de déduction). (3 pts)

I-2) Montrer que F1 et F2 sont des théorèmes ; sans utiliser des hypothèses. (3 pts)

II) Montrer que, dans CPF, on a :

(il existe une fbf A tel que $\vdash A$ et $\vdash \neg A$) si et seulement si (pour toute fbf B, on a : $\vdash B$). (1 pt)

Exercice 4 : (3 pts)

Montrer, à l'aide de la résolution propositionnelle, que p est une conséquence logique de la formule

$$F = (p \vee (q \wedge r)) \wedge (q \rightarrow \neg r) \quad (\text{c'est-à-dire : } F \models p).$$

Exercice 5 : (2 pts)

Soit $(G,*)$ un groupe. Traduire les phrases suivantes en formules du calcul des prédicats :

- a) Il y a au moins un idempotent.
- b) Il y a au moins deux idempotents.
- c) Il y a au plus deux idempotents.
- d) Il y a exactement deux idempotents.

On pourra noter « $I(x)$ » la formule « $x * x = x$ », exprimant que x est idempotent.

Bon courage !