

5 - الدوال اللوغاريتمية

1- الدالة «لوغاريتم نيربي»

1. مبرهنة وتعريف

- من أجل كل عدد حقيقي x موجب تماماً، المعادلة $x = e^t$ تقبل حلاً وحيداً t يرمز له $\ln x$.
- العدد الحقيقي $\ln x$ يقرأ اللوغاريتم النيربي لـ x .
- الدالة التي ترافق بكل عدد حقيقي موجب تماماً x العدد $\ln x$ تسمى الدالة «لوغاريتم نيربي».
- ويرمز لها بـ \ln .

ملاحظات :

1. الدالة $x \mapsto \ln x$ معرفة على المجال $[0; +\infty)$ و تأخذ قيمها في \mathbb{R} .

2. المعادلة $x = e^t$ تقبل حلاً وحيداً في \mathbb{R} : من أجل كل عدد حقيقي موجب تماماً x (لأن الدالة الأسية $x \mapsto e^x$ معرفة، مستمرة و متزايدة تماماً على \mathbb{R}).

3. حل المعادلة $y_0 = e^x$, حيث y_0 عدد حقيقي موجب تماماً هو العدد الحقيقي x فاصلة النقطة من المنحنى المثل للدالة $x \mapsto e^x$, ذات الترتيب y_0 .

نكتب : $x = \ln y_0$

4. من أجل كل عدد حقيقي y موجب تماماً، من أجل كل عدد حقيقي x

$$x = \ln y \text{ يكافئ } e^x = y$$

$$\ln e = 1 \quad e^1 = e \quad ; \quad \ln 1 = 0 \quad e^0 = 1 \quad .5$$

6. التمثيل المولالي يسمح بالقول أن الدالة

$x \mapsto \ln x$ هي الدالة العكسية للدالة $x \mapsto e^x$.

$$\exp : x \mapsto e^x \quad \ln : x \mapsto \ln x$$

$$\begin{array}{c} \xrightarrow{\exp} \\[-10pt] \curvearrowleft \\[-10pt] \ln \end{array}$$

7. من أجل كل عدد حقيقي x موجب تماماً،

$$\ln e^x = x \quad ; \quad e^{\ln x} = x$$

2. مبرهنة

الدالة «لوغاريتم النيربي» \ln قابلة للاشتاقاق على المجال $[0; +\infty)$ و من أجل كل عدد حقيقي

$$\ln x = \frac{1}{x}$$

3. خواص

من أجل كل عددين حقيقيين x و y موجبين تماماً و من أجل كل عدد ناطق n

$$\ln\left(\frac{x}{y}\right) = \ln x - \ln y$$

$$\ln(x^n) = n \ln x$$

$$\ln(xy) = \ln x + \ln y$$

$$\ln\left(\frac{1}{x}\right) = -\ln x$$

حالة خاصة: من أجل كل عدد حقيقي x موجب تماماً، $\ln \sqrt{x} = \frac{1}{2} \ln x$.

4. دراسة الدالة «اللوغاريتم النيابري»

الدالة \ln معرفة على المجال $[0; +\infty)$ و تأخذ قيمها في المجال $(-\infty; +\infty]$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty ; \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$$

الدالة \ln قابلة للاشتتقاق على المجال $[0; +\infty)$.


$$\text{و من أجل كل عدد حقيقي موجب تماماً } x : \ln' x = \frac{1}{x}$$

الدالة \ln مستمرة على المجال $[0; +\infty)$ لأنها قابلة للاشتتقاق على $[0; +\infty)$.

الدالة \ln متزايدة تماماً على المجال $[0; +\infty)$.

ما سبق يكون جدول تغيرات الدالة \ln كما يلي :

| | | |
|---------------|-----------|-----------|
| x | 0 | $+\infty$ |
| $\frac{1}{x}$ | | + |
| $\ln x$ | $-\infty$ | $+\infty$ |



المستقيم ذو المعادلة $y = x$ (أي محور التراتيب)

هو مستقيم مقارب للمنحنى الممثل للدالة \ln .

المنحنى الممثل للدالة \ln يقبل فرع قطع مكافئ بجوار $+\infty$.

في مستوى منسوب إلى معلم متعمد و متجانس

$(\ln x, x)$ (أي $x = 0$) المنحنيان المثلثان للدالتين \exp و \ln

متناهيان بالنسبة إلى المستقيم ذي المعادلة $y = x$.

5. نتائجتان

تستعمل هاتان النتيجتان لحل
معادلات و مترابحات.

من أجل كل عددين حقيقيين a و b موجبين تماماً،

$\ln a = \ln b$ إذا و فقط إذا كان $a = b$

$\ln a < \ln b$ إذا و فقط إذا كان $a < b$

معارف

6. اشتقة الدالة $x \mapsto \ln|u(x)|$
مبرهنة

دالة معرفة على مجال A.

إذا كانت الدالة u قابلة للاشتقاء على A ولا تنعدم على A فإن الدالة $|\ln|u(x)||$

قابلة للاشتقاء على A ومن أجل كل عدد حقيقي x من A،

$$(\ln|u(x)|)' = \frac{u'(x)}{u(x)}$$

7. نهايات شهيرة

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x-1} = 1 \quad ; \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x+1)}{x} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0 \quad ; \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x} = 0$$

II - دوال لوغاريتم ودوال أسيية أخرى

1. الدالة «اللوغاريتم العشري»

تعريف

الدالة «اللوغاريتم العشري» يرمز لها \log هي الدالة المعرفة على المجال $[0; +\infty)$ كما يلي :

$$\log x = \frac{\ln x}{\ln 10}$$

ملاحظات

• $\ln 10 \approx 2,30 \quad ; \quad \log 10 = 1 \quad ; \quad \log 1 = 0$

2. الدالة \log قابلة للاشتقاء على المجال $[0; +\infty)$

و دالتها المشتقة معرفة على $[0; +\infty)$ كما يلي :

$$(\log x)' = \frac{1}{x \ln 10}$$

3. الدالة \log لها نفس تغيرات الدالة \ln على المجال $[0; +\infty)$.

خواص

من أجل كل عددين حقيقيين x و y موجبين تماماً و من أجل كل عدد ناطق n،

$$\log\left(\frac{x}{y}\right) = \log x - \log y$$

$$\log(x^n) = n \log x$$

$$\log(xy) = \log x + \log y$$

$$\log\left(\frac{1}{x}\right) = -\log x$$

نتيجة : من أجل كل عددين حقيقيين a و b موجبين تماماً،

$$a = b \quad \text{يكافئ} \quad \log a = \log b$$

$$a < b \quad \text{يكافئ} \quad \log a < \log b$$

2. الدوال الأسية ذات الأسس

تعريف

ا عدد حقيقي موجب تماما حيث $a \neq 1$
نسمى الدالة الأسية ذات الأسس a ، يرمز لها \exp_a ، الدالة المعرفة على \mathbb{R} كما يلي $\exp_a(x) = a^x$

ملاحظة

من أجل كل عدد حقيقي x و من أجل كل عدد حقيقي a موجب تماما حيث $a \neq 1$

خواص

من أجل كل عددين حقيقيين a و b موجبين تماما حيث $a \neq 1$ و $b \neq 1$
و من أجل كل عددين حقيقيين x و y ،

$$(ab)^x = a^x b^x$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^x = \frac{a^x}{b^y}$$

$$a^{x-y} = \frac{a^x}{a^y}$$

$$(a^x)^y = a^{xy}$$

$$a^{x+y} = a^x a^y$$

$$a^{-x} = \frac{1}{a^x}$$

3. تغيرات الدالة \exp_a

• إذا كان $0 < a < 1$ فإن $\lim_{x \rightarrow +\infty} a^x = 0$

إذا كان $a > 1$ فإن $\lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = +\infty$

• الدالة \exp_a قابلة للاشتغال على \mathbb{R}

و من أجل كل عدد حقيقي x :

• إذا كان $0 < a < 1$ فإن الدالة \exp_a متناقصة تماما على \mathbb{R} .

إذا كان $a > 1$ فإن الدالة \exp_a متزايدة تماما على \mathbb{R} .


| x | $-\infty$ | $+\infty$ |
|----------|-----------|-----------|
| $(a^x)'$ | + | |
| a^x | 0 | $+\infty$ |

$a > 1$

| x | $-\infty$ | $+\infty$ |
|----------|-----------|-----------|
| $(a^x)'$ | - | |
| a^x | $+\infty$ | 0 |

• جدول التغيرات

$0 < a < 1$



- عندما a يسحق \mathbb{R}_+^* و $a \neq 1$ كل منحنيات الدالة \exp_a تشمل النقطة ذات الإحداثيين $(1 ; 0)$.
- محور الفواصل هو مستقيم مقارب أفقى لهذه المنحنيات.
- كل هذه المنحنيات تقبل فرع قطع مكافئ منحى هو منحي محور التراتيب.

III - الدالة «جذر نوني»

تعريف

n عدد طبيعي أكبر تماماً من 1.

نسمى الدالة «جذر نوني» ونرمز لها بـ $\sqrt[n]{x}$ ، الدالة المعرفة على المجال $[0; +\infty]$ والتي ترافق بكل عدد حقيقي x موجب ، العدد الموجب $\sqrt[n]{x} = x^{\frac{1}{n}}$ حيث $x \in [0; +\infty]$.

نتيجة

1. من أجل كل عدد حقيقي موجب x : $A = \sqrt[n]{x}$ يكفي

2. من أجل كل عدد حقيقي موجب x : $\sqrt[n]{x} = x^{\frac{1}{n}}$

3. من أجل كل عدد حقيقي x موجب تماماً :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \sqrt[n]{x} = 0 ; \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{x} = +\infty . \quad 4$$

IV - التزايدات المقارنة

نعلم أن $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^n = +\infty$ حيث n عدد طبيعي غير منعدم.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty ; \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$$

مبرهنة

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^n} = 0$ n عدد طبيعي غير منعدم.

نتيجة

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^n e^x = 0 ; \lim_{x \rightarrow 0} x^n \ln x = 0$$

التفسير البياني للتزايدات المقارنة

نرسم المنحنيات الممثلة للدوال

$$x \mapsto e^x ; x \mapsto \ln x ; x \mapsto x^3$$

في نفس المعلم المتعامد (i ; j ; O) ، (الشكل).

نلاحظ أنه يوجد عدد حقيقي موجب تماماً A حيث من أجل $x > A$ يكون $e^x > x^3 > \ln x$ (بالحاسبة $A \approx 4,6$).


نقول إن الدالة $x \mapsto e^x$ تزايد بسرعة أكبر بالنسبة إلى

الدالة $x \mapsto x^3$ و الدالة $x \mapsto \ln x$ تزايد بسرعة أكبر بالنسبة إلى الدالة $x \mapsto x$ بجوار $+\infty$.

بصفة عامة، من أجل كل عدد طبيعي n أكبر تماماً من 1، يوجد عدد حقيقي موجب تماماً A حيث

من أجل $x > A$ يكون $e^x > x^n > \ln x$. أي الدالة $x \mapsto e^x$ تزايد بسرعة أكبر بالنسبة إلى

الدالة $x \mapsto x^n$ و الدالة $x \mapsto \ln x$ تزايد بسرعة أكبر بالنسبة إلى الدالة $x \mapsto x$ بجوار $+\infty$.



اكتب على أبسط شكل الأعداد التالية :

$$\ln 72 - 2\ln \frac{27}{256} + \ln \sqrt{108} : \ln \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \ln 8 + 4\ln \sqrt{2} : \ln 32$$

$$\ln \frac{1}{8} - \ln 0,375 + 2\ln \sqrt{0,5625}$$

حل

$$\ln 32 = 5\ln 2 \quad \text{إذن} \quad \ln 32 = \ln 2^5 = 5\ln 2 \quad 1 \cdot \text{ لدينا}$$

$$\ln \sqrt{2} = \ln 2^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2} \ln 2 : \ln 8 = \ln 2^3 = 3\ln 2 : \ln \frac{1}{2} = -\ln 2 \quad 2 \cdot \text{ لدينا}$$

$$\begin{aligned} \ln \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \ln 8 + 4\ln \sqrt{2} &= -\ln 2 + \frac{1}{2} \times 3\ln 2 + 4 \times \frac{1}{2} \ln 2 \\ &= -\ln 2 + \frac{3}{2} \ln 2 + 2\ln 2 \\ &= \left(-1 + \frac{3}{2} + 2\right) \ln 2 = \frac{5}{2} \ln 2 \end{aligned} \quad \text{إذن}$$

$$\ln \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \ln 8 + 4\ln \sqrt{2} = \frac{5}{2} \ln 2 \quad \text{ينتج أن}$$

$$\begin{aligned} \ln 72 &= \ln (9 \times 8) = \ln 9 + \ln 8 \quad 3 \cdot \text{ لدينا} \\ &= 2\ln 3 + 3\ln 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \ln \frac{27}{256} &= \ln 27 - \ln 256 = \ln 3^3 - \ln 2^8 \\ &= 3\ln 3 - 8\ln 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \ln \sqrt{108} &= \frac{1}{2} \ln 108 = \frac{1}{2} \ln 4 \times 27 \\ &= \frac{1}{2} \ln 4 + \frac{1}{2} \ln 27 = \ln 2 + \frac{3}{2} \ln 3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \ln 72 - 2\ln \frac{27}{256} + \ln \sqrt{108} &= 2\ln 3 + 3\ln 2 - 2(3\ln 3 - 8\ln 2) + \ln 2 + \frac{3}{2} \ln 3 \\ &= 2\ln 3 + 3\ln 2 - 6\ln 3 + 16\ln 2 + \ln 2 + \frac{3}{2} \ln 3 \end{aligned} \quad \text{إذن}$$

$$= \left(2 - 6 + \frac{3}{2}\right) \ln 3 + (3 + 16 + 1) \ln 2 = -\frac{5}{2} \ln 3 + 20\ln 2$$

$$\ln 72 - 2\ln \frac{27}{256} + \ln \sqrt{108} = -\frac{5}{2} \ln 3 + 20\ln 2 \quad \text{إذن}$$

$$\ln \frac{1}{8} = -\ln 8 = -3\ln 2 \quad ٤. \text{ لدينا}$$

$$\ln 0,375 = \ln \frac{375}{1000} = \ln \frac{3}{8} = \ln 3 - \ln 8 = \ln 3 - 3\ln 2$$

$$2\ln \sqrt{0,5625} = \ln 0,5625 = \ln \frac{5625}{10000} = \ln \frac{5}{16} = \ln 9 - \ln 16 = 2\ln 3 - 4\ln 2$$

$$\ln \frac{1}{8} - \ln 0,375 + 2\ln \sqrt{0,5625} = -3\ln 2 - \ln 3 + 3\ln 2 + 2\ln 3 - 4\ln 2 \quad \text{إذن}$$

$$= -4\ln 2 + \ln 3$$

$$\ln \frac{1}{8} - \ln 0,375 + 2\ln \sqrt{0,5625} = -4\ln 2 + \ln 3 \quad \text{و بالتالي}$$

٢ حل معادلات و مترابجحات

تمرين ١

حل في \mathbb{R} كل معادلة من المعادلات التالية

$$\ln x + \ln(3x+2) = \ln(2x+3) : \ln(x-1) = 2\ln 3 - 3\ln 2 : \ln x = 2$$

$$\ln(x^2 - 2x - 3) = \ln(x+7)$$

حل

$$1. \text{ حل المعادلة } \ln x = 2$$

معروف إذا كان $x > 0$. $\ln x$

إذن $\ln x = 2$ يعني $x > 0$ و $\ln x = \ln e^2$ و بالتالي

يُنتج أن المعادلة $\ln x = 2$ تقبل حلًا واحدًا في \mathbb{R} هو e^2 .

طريقة أخرى: نعلم أن من أجل $x > 0$ و y عدد حقيقي، $y = \ln x$ يكافيء $x = e^y$ إذن $\ln x = 2$ إذن $x = e^2$

$$2. \text{ حل المعادلة } \ln(x-1) = 2\ln 3 - 3\ln 2$$

معروف إذا كان $0 < x-1 < 1$ أي $x > 1$.

إذن $\ln(x-1) = \ln 3^2 - \ln 2^3$ يعني $1 < x < 8$ و $\ln(x-1) = 2\ln 3 - 3\ln 2$

$$\ln(x-1) = \ln \frac{9}{8} \quad \text{أي} \quad x > 1$$

$$\text{و بالتالي} \quad x = \frac{17}{8} \quad \text{أي} \quad x-1 = \frac{9}{8}$$

يُنتج أن المعادلة $\ln(x-1) = 2\ln 3 - 3\ln 2$ تقبل حلًا واحدًا وهو $\frac{17}{8}$

$$\ln x + \ln(3x+2) = \ln(2x+3) \quad 3. \text{ حل المعادلة}$$

لحل هذه المعادلة نضع الشرط التالي $x > 0$ و $3x+2 > 0$ و $2x+3 > 0$ أي $x > 0$.

$$\ln x + \ln(3x+2) = \ln(2x+3) \quad \text{يعني} \quad \ln x + \ln(3x+2) = \ln(2x+3)$$

$$x(3x+2) = 2x+3 \quad \text{إذن} \quad x > 0 \quad \text{و}$$

$$3x^2 + 2x = 2x+3 \quad \text{أي} \quad x > 0$$

$$3x^2 - 3 = 0 \quad \text{أي} \quad x > 0$$

$$x(x+1)(x-1) = 0 \quad \text{إذن} \quad x = 0 \quad \text{و} \quad x = 1 \quad \text{أو} \quad x = -1 \quad \text{يتحقق أن}$$

وبالتالي المعادلة $\ln x + \ln(3x+2) = \ln(2x+3)$ تقبل حلاً واحداً هو 1.

$$\ln(x^2 - 2x - 3) = \ln(x+7) \quad 4. \text{ حل المعادلة}$$

$$x^2 - 2x - 3 > 0 \quad \text{لحل هذه المعادلة نضع الشرط التالي} \quad x > 0 \quad \text{و}$$

$$x^2 - 2x - 3 = (x+1)(x-3) \quad \text{لدينا}$$

$$x^2 - 2x - 3 > 0 \quad \text{إذن} \quad x \in]-\infty; -1] \cup [3; +\infty[\quad \text{إذا و فقط إذا كان}$$

$$x > 0 \quad \text{إذا و فقط إذا كان} \quad x > -7 \quad \text{و}$$

$$x \in]-7; -1] \cup [3; +\infty[\quad \text{يتحقق أن}$$

$$\ln(x^2 - 2x - 3) = \ln(x+7) \quad \text{في المجموعة} \quad . \quad]-7; -1] \cup [3; +\infty[$$

$$x \in]-7; -1] \cup [3; +\infty[\quad \text{إذا و فقط إذا كان} \quad \ln(x^2 - 2x - 3) = \ln(x+7)$$

$$x^2 - 3x - 10 = 0 \quad \text{أي} \quad x \in]-7; -1] \cup [3; +\infty[\quad x^2 - 2x - 3 = x + 7$$

$$\ln(x^2 - 3x - 10) = 0 \quad \text{في المجموعة} \quad . \quad]-7; -1] \cup [3; +\infty[$$

$$x_1 = 5 \quad \text{و} \quad x_2 = -2 \quad \Delta = 49 \quad \Delta > 0 \quad \text{إذن المعادلة تقبل حلين مختلفين هما} \quad 5 \quad \text{و} \quad -2$$

$$x \in]-7; -1] \cup [3; +\infty[\quad \text{لدينا} \quad 5 \quad \text{و} \quad -2 \quad \text{ينتميان إلى المجموعة}$$

$$\ln(x^2 - 2x - 3) = \ln(x+7) \quad \text{وبالتالي المعادلة تقبل حلين مختلفين هما} \quad 5 \quad \text{و} \quad -2.$$

ćمرين 2

حل كل مراجحة من المراجحات التالية

$$\ln(x+1) + \ln(3-x) < 0 \quad : \quad \ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right) > 0 \quad : \quad \ln(x-1) \geq 0$$

$$\ln(x^2 - 1) \geq \ln(4x - 1)$$

١. حل المتراجحة $\ln(x-1) \geq 0$

لحل المتراجحة $\ln(x-1) \geq 0$ نضع الشرط التالي $x-1 > 0$ أي $x > 1$

حل المتراجحة $\ln(x-1) \geq 0$ في المجال $[1; +\infty)$

لدينا $0 \geq \ln(x-1) \geq \ln 1$ يعني $x > 1$ و

أي $x \geq 2$ و $x-1 \geq 1$ أي $x > 1$ و $x \geq 2$ إذن

وبالتالي مجموعة حلول المتراجحة $\ln(x-1) \geq 0$ هي $[2; +\infty)$

٢. حل المتراجحة $\ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right) > 0$

لحل المتراجحة $\ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right) > 0$ نضع الشرط التالي $-1 \neq x$ و

$x \in]-\infty; -1] \cup [1; +\infty[$ أي

حل في المجموعة $]-\infty; -1] \cup [1; +\infty[$ المتراجحة $\ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right) > 0$

لدينا $0 > \ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right) > \ln 1$ يعني $\ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right) > 0$ أي

$\frac{2}{x+1} < 0$ أي $\frac{-2}{x+1} > 0$ أي $\frac{x-1}{x+1} - 1 > 0$ أي

إذن $x+1 < 0$ وبالتالي $x < -1$

ينتظر أن مجموعة حلول المتراجحة $\ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right) > 0$ هي $]-\infty; -1]$

٣. حل المتراجحة $\ln(x+1) + \ln(3-x) < 0$

لحل المتراجحة $\ln(x+1) + \ln(3-x) < 0$ نضع الشرط التالي $x+1 > 0$ و $3-x > 0$

أي $x > -1$ و $x < 3$ أي $x \in]-1; 3[$

حل المتراجحة $\ln(x+1) + \ln(3-x) < 0$ في المجال $[-1; 3[$

لدينا $\ln(x+1)(3-x) < \ln 1$ يعني $\ln(x+1) + \ln(3-x) < 0$

إذن $x^2 - 2x - 2 > 0$ وبالتالي $(x+1)(3-x) < 1$

أي $(x-1+\sqrt{3})(x-1-\sqrt{3}) > 0$

إذن $x \in]-1; 1-\sqrt{3}[\cup]1+\sqrt{3}; 3[$ إذن $x \in]-\infty; 1-\sqrt{3}[\cup]1+\sqrt{3}; +\infty[$

ينتظر أن مجموعة حلول المتراجحة $\ln(x+1) + \ln(3-x) < 0$ هي $]-1; 1-\sqrt{3}[\cup]1+\sqrt{3}; 3[$

٤٠ حل المتراجحة . $\ln(x^2 - 1) \geq \ln(4x - 1)$

لحل المتراجحة (١) $x^2 - 1 > 0$ نضع الشرط التالي $\ln(x^2 - 1) \geq \ln(4x - 1)$ و $4x - 1 > 0$ أي $x \in [1; +\infty[$.

حل المتراجحة (١) في المجال $[1; +\infty[$ لدينا $x^2 - 4x \geq 0$ إذا و فقط إذا كان $x^2 - 1 \geq 4x - 1$ أي $x(x - 4) > 0$ إذن $x \in [4; +\infty[$ أي $x \geq 4$ وبالتالي ينتج أن مجموعة حلول المتراجحة (١) هي $[4; +\infty[$.

حساب نهايات ٣

تمرين

احسب النهايات التالية :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 + (\ln x)^2) : \lim_{x \rightarrow 1} \ln \left(\frac{1-x}{1+x} \right) : \lim_{x \rightarrow +\infty} (2x - \ln x)$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) : \lim_{x \rightarrow -\infty} x \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) : \lim_{x \rightarrow 0} (x^2 + (\ln x)^2)$$

حل

١٠ حساب النهاية $\lim_{x \rightarrow +\infty} (2x - \ln x)$ الدالة $x \mapsto 2x - \ln x$ معرفة على المجال $[0; +\infty[$.

لدينا $\lim_{x \rightarrow +\infty} (2x - \ln x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(2 - \frac{\ln x}{x} \right)$ بما أن $0 < \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$ نعلم أن $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(2 - \frac{\ln x}{x} \right) = +\infty$ إذن $\lim_{x \rightarrow +\infty} (2x - \ln x) = +\infty$ ينتج أن

٢٠ حساب النهاية $\lim_{x \rightarrow 1} \ln \left(\frac{1-x}{1+x} \right)$ الدالة $x \mapsto \ln \left(\frac{1-x}{1+x} \right)$ معرفة على المجال $[-1; 1[$.

لدينا $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1-x}{1+x} = 0$ وعلى المجال $[-1; 1[$ $\frac{1-x}{1+x} > 0$ إذن $\lim_{x \rightarrow 1} \ln \left(\frac{1-x}{1+x} \right) = -\infty$

٣ • حساب النهاية

الدالة $x \mapsto x^2 + (\ln x)^2$ معرفة على المجال $[0; +\infty]$.
 $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\ln x)^2 = +\infty$ إذن $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$
 $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 + (\ln x)^2) = +\infty$ ينتج أن $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty$ و نعلم أن

٤ • حساب النهاية

لدينا $\lim_{x \geq 0} \ln x = -\infty$ و نعلم أن $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 = 0$
 $\lim_{x \geq 0} (x^2 + (\ln x)^2) = +\infty$ إذن $\lim_{x \geq 0} (\ln x)^2 = +\infty$

٥ • حساب النهاية

الدالة $x \mapsto x \ln \left(1 + \frac{1}{x}\right)$ معرفة على المجال $(-\infty; -1] \cup [0; +\infty)$.
 $\lim_{x \rightarrow -\infty} x = -\infty$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} \ln \left(1 + \frac{1}{x}\right) = 0$ إذن توجد حالة عدم التعين.

نضع $y \rightarrow 0$: $x \rightarrow -\infty$ عندما $y = \frac{1}{x}$

$$x \ln \left(1 + \frac{1}{x}\right) = \frac{\ln(1+y)}{y} \quad \text{لدينا}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x \ln \left(1 + \frac{1}{x}\right) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\ln(1+y)}{y} = 1 \quad \text{ينتج أن}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x \ln \left(1 + \frac{1}{x}\right) = 1 \quad \text{وبالتالي}$$

٦ • حساب النهاية

بوضع $y = \frac{1}{x}$ لدينا $y \rightarrow 0$: $x \rightarrow +\infty$ و عندما

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln \left(1 + \frac{1}{x}\right) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\ln(1+y)}{y} = 1 \quad \text{إذن}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln \left(1 + \frac{1}{x}\right) = 1 \quad \text{وبالتالي}$$

تمرين ١

دالة معرفة على المجال $[0; +\infty]$ كما يلي : إذا كان $x > 0$ $f(x) = x^2(-1 + 2\ln x)$ و $f(0) = 0$.

هل الدالة f قابلة للاشتغال عند العدد 0 عن اليمين ؟

عين الدالة المشتقة f' للدالة f .

حل

الدالة f معرفة على المجال $[0; +\infty]$.

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{x^2(-1 + 2\ln x)}{x}$$

لدينا

من أجل كل عدد حقيقي x موجب تماماً : $\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = x(-1 + 2\ln x)$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} x(-1 + 2\ln x)$$

لدينا

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} (-x + 2x\ln x) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = 0$$

وبالتالي

يُنتَج أن الدالة f قابلة للاشتغال عند العدد 0 عن اليمين و $f'(0) = 0$.

الدالة f قابلة للاشتغال على المجال $[0; +\infty]$ (قابلة للاشتغال على المجال $[0; +\infty]$ و قابلة للاشتغال عند العدد 0 عن اليمين).

$$\begin{aligned} f'(x) &= 2x(-1 + 2\ln x) + x^2 \left(\frac{2}{x}\right) : x \\ &= -2x + 4x\ln x + 2x \\ &= 4x\ln x \end{aligned}$$

أي من أجل كل عدد حقيقي موجب تماماً x و $f'(x) = 4x\ln x$.

إذن الدالة f' معرفة كما يلي : $f'(x) = 4x\ln x$ إذا كان $x > 0$ و $f'(0) = 0$.

تمرين 2

f هي الدالة المعرفة كما يلي :

1. عين مجموعة تعريف الدالة f .

2. ادرس قابلية اشتتقاق الدالة f على مجموعة تعريفها.

3. عين الدالة المشتقة f' للدالة f .

حل

1. من أجل كل عدد حقيقي $x > 0$. إذن الدالة f معرفة على \mathbb{R} .

2. الدالة $x \mapsto e^{-x}$ قابلة للاشتتقاق على \mathbb{R}

و الدالة $x \mapsto \ln(1 + e^{2x})$ قابلة للاشتتقاق على \mathbb{R} . (اشتقاق دالة مركبة) إذن الدالة f قابلة للاشتتقاق على \mathbb{R} . (اشتقاق جداء دالتين).

3. تعين الدالة المشتقة f' للدالة f .

$$f'(x) = -e^{-x} \ln(1 + e^{2x}) + e^{-x} \left(\frac{2e^{2x}}{1 + e^{2x}} \right)$$

$$= -e^{-x} \ln(1 + e^{2x}) + \frac{2e^x}{1 + e^{2x}}$$

$$f'(x) = -e^{-x} \ln(1 + e^{2x}) + \frac{2e^{2x}}{1 + e^{2x}}$$

إذن من أجل كل عدد حقيقي x :

تمرين 3

f هي الدالة المعرفة كما يلي :

1. عين مجموعة تعريف الدالة f .

2. عين الدالة المشتقة f' للدالة f .

حل

1. الدالة f معرفة إذا و فقط إذا كان $2+x \neq 0$ و $2-x > 0$ أي $x \in]-2 ; 2[$

و بالتالي مجموعة تعريف الدالة f هي المجال $]-2 ; 2[$.

2. الدالة f قابلة للاشتتقاق على المجال $]-2 ; 2[$.

و من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]-2 ; 2[$:

$$\left(\frac{2-x}{2+x} \right)' = \frac{-4}{(2+x)^2}$$

لدينا من أجل كل عدد حقيقي من المجال $]-2 ; 2[$:

تمرين

الدالة المعرفة على $f : \mathbb{R} - \left\{-1; -\frac{1}{2}\right\}$ كما يلي :

1. عين الأعداد الحقيقية a, b, c حيث من أجل كل عدد حقيقي x يختلف عن $\frac{1}{2}$ و -1

$$f(x) = a + \frac{b}{2x+1} + \frac{c}{x+1}$$

2. استنتج الدالة الأصلية F للدالة f على المجال $\left[-\frac{1}{2}; +\infty\right]$ حيث $F(0) = -1$

حل

1. الدالة f معرفة على المجموعة $\mathbb{R} - \left\{-1; -\frac{1}{2}\right\}$

لدينا من أجل كل عدد حقيقي x يختلف عن $\frac{1}{2}$ و -1

$$a + \frac{b}{2x+1} + \frac{c}{x+1} = \frac{a(2x+1)(x+1) + b(x+1) + c(2x+1)}{(2x+1)(x+1)}$$

$$= \frac{2ax^2 + (3a+b+2c)x + a+b+c}{2x^2 + 3x + 1}$$

$$f(x) = a + \frac{b}{2x+1} + \frac{c}{x+1} \quad \text{إذن}$$

$$\frac{2ax^2 + (3a+b+2c)x + a+b+c}{2x^2 + 3x + 1} = \frac{2x^2 - x - 2}{2x^2 + 3x + 1} \quad \text{يعني}$$

ينتاج أن $a+b+c = -2$ و $3a+b+2c = -1$ و $2a = 2$

باستعمال طريقة التعويض، ينتج أن $a = 1$ و $b = -2$ و $c = -1$

إذن من أجل كل عدد حقيقي x يختلف عن $\frac{1}{2}$ و -1 :

2. تعين الدالة الأصلية F للدالة f على المجال $\left[-\frac{1}{2}; +\infty\right]$ حيث $F(0) = -1$

الدالة $x \mapsto x$ هي دالة أصلية للدالة $x \mapsto 1$ على $\left[-\frac{1}{2}; +\infty\right]$

الدالة $x \mapsto \frac{2}{2x+1}$ هي دالة أصلية للدالة $x \mapsto \ln(2x+1)$

الدالة $x \mapsto \frac{1}{x+1}$ هي دالة أصلية للدالة $x \mapsto \ln(x+1)$

(استعمال المبرهنة حول الدوال الأصلية للدوال من الشكل $(x \mapsto \frac{u'(x)}{u(x)})$)

إذن الدوال الأصلية للدالة f على $[-\frac{1}{2}; +\infty)$ هي الدوال

$d \in \mathbb{R}$ حيث $x \mapsto x - \ln(2x+1) - \ln(x+1) + d$

لدينا $F(0) = -1$ أي $0 + d = -1$ ينتج أن $d = -1$.

إذن الدالة الأصلية F للدالة f على $[-\frac{1}{2}; +\infty)$ حيث

$x \mapsto x - \ln(2x+1) - \ln(x+1) - 1$ هي الدالة

6 استعمال اللوغاريتم العشري والدالة الأسية ذات الأساس α

تمرين 1

بسط الأعداد التالية :

$$\sqrt[4]{25} \times 125^{\frac{3}{4}} : \sqrt[3]{729} : \log(0,81 \times 10^{-2} \times 3^{13}) : \log 16$$

حل

$$\log 16 = \log 2^4 = 4 \log 2 \quad \text{لدينا} \cdot$$

$$\therefore \log 16 = 4 \log 2 \quad \text{إذن}$$

$$\log(0,81 \times 10^{-2} \times 3^{13}) = \log 0,81 + \log 10^{-2} + \log 3^{13} \quad \text{لدينا} \cdot$$

$$= \log \frac{81}{100} - 2 + 13 \log 3$$

$$= \log 81 - \log 100 + (-2) + 13 \log 3$$

$$= 4 \log 3 - 2 - 2 + 13 \log 3$$

$$= -4 + 17 \log 3$$

$$\therefore \log(0,81 \times 10^{-2} \times 3^{13}) = -4 + 17 \log 3 \quad \text{إذن}$$

$$\sqrt[3]{729} = \sqrt[3]{3^6} = \sqrt[3]{(3^2)^3} = 3^2 = 9 \quad \text{لدينا} \cdot$$

$$\sqrt[4]{25} \times 125^{\frac{3}{4}} = \sqrt[4]{5^2} \times 5^{\frac{9}{4}} \quad \text{لدينا} \cdot$$

$$= 5^{\frac{1}{2}} \times 5^{\frac{9}{4}} = 5^{\frac{11}{4}}$$

$$\therefore \sqrt[4]{25} \times 125^{\frac{3}{4}} = 5^{\frac{11}{4}} \quad \text{إذن}$$

تمرين

حل في \mathbb{R} كل معادلة من المعادلات التالية

$$10^{4x} = 9 \quad ; \quad \log(2x) - \log(x+1) = \log(x-1) \quad ; \quad \log(3x+4) = 0$$

$$10^x - 2 \times 10^{-x} = 1$$

حل

• حل المعادلة $\log(3x+4) = 0$ بوضع الشرط $3x+4 > 0$ ؛ أي $x \in \left[-\frac{4}{3}; +\infty\right[$

$\log(3x+4) = \log 1$ يعني $x \in \left[-\frac{4}{3}; +\infty\right[$ أي $x = -1$ و $3x+4 = 1$. إذن $x \in \left[-\frac{4}{3}; +\infty\right[$ أي $x = -1$. وبالتالي المعادلة $\log(3x+4) = 0$ تقبل حلا واحدا هو -1 .

• حل المعادلة $\log(2x) - \log(x+1) = \log(x-1)$ بوضع الشرط $2x > 0$ و $x+1 > 0$ و $x-1 > 0$ أي $x > 1$

$$\log\left(\frac{2x}{x+1}\right) = \log(x-1) \text{ يعني } \frac{2x}{x+1} = x-1 \text{ و } x > 1$$

$$x^2 - 2x - 1 = 0 \text{ و } x > 1 \text{ أي } x = 1 + \sqrt{2}$$

. حلا المعادلة $x^2 - 2x - 1 = 0$ هما $1 + \sqrt{2}$ و $1 - \sqrt{2}$

إذن المعادلة $\log(2x) - \log(x+1) = \log(x-1)$ تقبل حلا واحدا هو $1 + \sqrt{2}$

• حل المعادلة $9 = 10^{4x}$ حيث x عدد حقيقي.

$$\log 10^{4x} = \log 9 \text{ يعني } 10^{4x} = 9$$

$$x = \frac{1}{4} \log 9 \text{ إذن } 4x = \log 9 \text{ أي } x = \frac{1}{4} \log 9$$

و وبالتالي المعادلة $10^{4x} = 9$ تقبل حلا واحدا في \mathbb{R} هو $\frac{1}{4} \log 9$

• حل المعادلة $1 = 10^x - 2 \times 10^{-x}$

$$10^x - 2 \times \frac{1}{10^x} - 1 = 0 \quad \text{يكافئ} \quad 10^x - 2 \times 10^{-x} = 1$$

$$(10^x)^2 - 10^x - 2 = 0 \quad \text{أي} \quad 10^{2x} - 10^x - 2 = 0$$

بوضع $t = 10^x$, نحل المعادلة $t^2 - t - 2 = 0$ حيث $t > 0$. ينتج أن $t = 2$

$$x = \log 2 \text{ و } t = 10^x \text{ إذن } 10^x = 2 \text{ و وبالتالي } t = 2$$

لدينا $x = \log 2$. ينتج أن المعادلة $1 = 10^x - 2 \times 10^{-x}$ تقبل حلا واحدا هو $\log 2$

تمارين و حلول مفهوجية

مسألة

f دالة معرفة كما يلي : $f(x) = -\frac{x}{x+1} + \ln(x+1)$ و (C) المنحنى الممثل لها في المستوى

النسبو إلى معلم متعمد و متجانس (\vec{i}, \vec{j}). (الوحدة 2 cm).

1. عين مجموعة التعريف E للدالة f.

2. أدرس نهاية الدالة f عندما يؤول x إلى 1- بقيم أكبر.

(يمكن كتابة $f(x)$ على الشكل $\varphi(x) = \frac{1}{x+1}$).

3. ادرس تغيرات الدالة f.

4. عين معادلة للمماس (T) للمنحنى (C) عند النقطة ذات لفاصلة 1.

5. ادرس تغيرات الدالة g المعرفة كما يلي : $g(x) = f(x) - \left(\frac{1}{4}x - \frac{3}{4} + \ln 2\right)$

استنتج إشارة (x) g ثم الوضع النسبي للمنحنى (C) والمماس (T).

6. ارسم المنحنى (C).

7. بين أنه يوجد عددان حقيقيان a و b حيث من أجل كل عدد حقيقي x من E، $\frac{x}{x+1} = a + \frac{b}{x+1}$

. باستعمال المتكاملة بالتجزئة، احسب التكامل $\int_0^1 \ln(1+x) dx$.

8. احسب المساحة A للحيز المستوي المحدود بالمنحنى (C) والمستقيمات ذات المعادلات

$x=1$: $x=0$: $y=0$. عين قيمة A بالسنتيمترات المربعة.

حل

1. الدالة $x \mapsto -\frac{x}{x+1}$ معرفة على $\mathbb{R} - \{-1\}$ والدالة $x \mapsto \ln(x+1)$ معرفة من أجل

$x > -1$. أي $x \in [-1; +\infty]$. إذن مجموعة تعريف الدالة f هي $[-1; +\infty]$. أي $E = [-1; +\infty]$.

2. من أجل كل عدد حقيقي x من $[-1; +\infty]$:

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} (x+1) \ln(x+1) = 0 \quad \text{لأن } \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$$

$$\text{وبالتالي } \lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{1}{x+1} = +\infty \quad \text{و لدينا } \lim_{x \rightarrow -1^+} [-x + (x+1) \ln(x+1)] = +\infty$$

$$\text{بما أن } \lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = +\infty \quad \text{و} \quad \lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{1}{x+1} = +\infty$$

$$3. \text{ لدينا } \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \ln(x+1) = +\infty \quad \text{و} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \left(-\frac{x}{x+1}\right) = -1$$

الدالة f قابلة للاشتاقاق على المجال $[+1; +\infty]$ و من أجل كل عدد حقيقي x

$$f'(x) = \frac{x}{(x+1)^2}$$

إشارة $f'(x)$ على E هي إشارة x على E . ينبع أن الدالة f متناقصة على المجال $[-1; 0]$.

و متزايدة على المجال $[0; +\infty)$.

جدول تغيرات الدالة f :

دراسة الفروع اللاحائية للمنحنى (\mathcal{C}) .

إذن المستقيم ذو المعادلة $x = -1$ مستقيم مقارب يوازي محور التربيع.

$$\frac{f(x)}{x} = -\frac{1}{x+1} + \left(\frac{x+1}{x}\right) \ln\left(\frac{x+1}{x}\right) \text{ لأن } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = 0 \text{ و } \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = +\infty$$

و $0 = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(x+1)}{x+1}$ إذن المنحنى (\mathcal{C}) يقبل فرع قطع مكافئ وفي اتجاه محور الفواصل بحوار $+\infty$.

$$.\text{ لدينا } f'(1) = -\frac{1}{2} + \ln 2$$

إذن معادلة الماس (T) عند النقطة ذات الفاصلة 1 هي $y = \frac{1}{4}x - \frac{3}{4} + \ln 2$

دراسة تغيرات الدالة g .

الدالة g معرفة وقابلة للاشتباك على المجال $[-1; +\infty)$ و من أجل كل عدد حقيقي x

$$\text{من } [-1; +\infty) : g'(x) = -\frac{(x-1)^2}{4(x+1)^2} \text{ نلاحظ أن } g'(x) = 0 \text{ من أجل } x = 1$$

إذن من أجل كل عدد حقيقي من $[-1; +\infty)$.

و بالتالي الدالة g متناقصة تماما على المجال $[-1; +\infty)$.

جدول تغيرات g :

| x | -1 | 1 | $+\infty$ |
|---------|-----------|---|-----------|
| $g'(x)$ | - | 0 | - |
| $g(x)$ | $+\infty$ | 0 | $-\infty$ |

$$\text{لدينا } g(1) = 0 \text{ و } \lim_{x \rightarrow -1} g(x) = +\infty \text{ و } \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = -\infty$$

من جدول تغيرات الدالة g ينبع أن $g(x) < 0$ على المجال $[1; +\infty)$.

ينتاج أن (\mathcal{C}) فوق (T) على المجال $[-1; 1]$ ، (\mathcal{C}) تحت (T) على المجال $[1; +\infty)$.

(T) يقطع (\mathcal{C}) في النقطة ذات الفاصلة 1.


نلاحظ أن النقطة ذات الفاصلة 1 من (\mathcal{C})

هي نقطة إنعطاف (\mathcal{C}) (لأن (T)

يقطع (\mathcal{C}) فيها).

6. رسم المنحنى (\mathcal{C}) والماس (T) .

$$f(1) = -\frac{1}{2} + \ln 2 \approx 0,19 \\ -\frac{3}{4} + \ln 2 \approx 0,60$$



7 . من أجل كل عدد حقيقي x من E : $b = -1$ و $a = 1$ إذن $\frac{x}{x+1} = 1 - \frac{1}{x+1}$

8 . حساب التكامل $\int_0^1 \ln(1+x) dx$

$u'(x) = \frac{1}{x+1}$ و $v(x) = x + 1$ إذن $u(x) = \ln(x+1)$ و $v'(x) = 1$

يتبين أن $\int_0^1 \ln(x+1) dx = [(x+1)\ln(x+1)]_0^1 - \int_0^1 \frac{x+1}{x+1} dx$

$$= [(x+1)\ln(x+1) - x]_0^1 = 2\ln 2 - 1$$

إذن $\int_0^1 \ln(x+1) dx = 2\ln 2 - 1$

ملاحظة : يمكن اختيار $v(x) = x$ لحساب التكامل السابق.

$$\mathcal{A} = \int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 \left[(-1 + \frac{1}{x+1} + \ln(x+1)) \right] dx \quad .9$$

$$= [-x + \ln(x+1) + (x+1)\ln(x+1) - x]_0^1$$

$$= -2 + 3\ln 2$$

إذن $\mathcal{A} = -2 + 3\ln 2$ وحدة المساحات

و بالتالي $\mathcal{A} \approx 0,32 \text{ cm}^2$ أي $\mathcal{A} = 4(-2 + 3\ln 2) \text{ cm}^2$

تمارين و مسائل

$$\ln\left(\frac{x+7}{x+1}\right) = \ln(x+3)$$

$$\frac{1}{2} \ln(1+x^2) = \ln(x+2)$$

$$\frac{1}{2} \ln(x-1) + \ln(x+1) = 2 + \ln\sqrt{1+x}$$

كثير حدود حيث $P(x)$ 8

$$P(x) = 12x^3 + x^2 - 9x + 2$$

1. عين الأعداد الحقيقة a, b, c حيث من أجل

$$P(x) = (x+1)(ax^2 + bx + c) \text{ حيث } x \text{ كل عدد حقيقي}$$

. $P(x) = 0$ المعادلة حل في \mathbb{R}

2. استنتج حلول المعادلة

$$12(\ln x)^3 + (\ln x)^2 - 9 \ln x + 2 = 0$$

متراجحات

9 حل في \mathbb{R} كل متراجحة من المتراجحات

$$\ln\left(\frac{x+1}{2x+1}\right) \geq 0 \quad : \quad \ln(3-x) \leq 0 \quad : \quad \text{التالية :}$$

$$\ln(x+2) + \ln(3+x) > 0$$

$$\ln(x^2 - 4) > \ln(6x+5)$$

$$\ln(2x-5) + \ln(x+1) \leq 2 \ln 2$$

10 حل في \mathbb{R} كل متراجحة من المتراجحات

$$\ln(x+1) > \ln(4x-2) - \ln(x-1) \quad : \quad \text{التالية :}$$

$$\ln(x^2 + 11x + 30) > \ln(x+14)$$

$$\ln\left(\frac{x+1}{3x-5}\right) \geq 0 \quad : \quad \ln(x^2 - 2e^2) \leq \ln x + 1$$

الجمل

11 حل كل جملة من الجمل التالية في $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 5 \\ \ln x + \ln y = \ln 2 \end{cases} \quad ; \quad \begin{cases} x+y=30 \\ \ln x + \ln y = 3 \ln 6 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \ln x + \ln y = \ln \frac{2}{3} \\ x+y=\frac{4}{3} \end{cases} \quad ; \quad \begin{cases} 2 \ln x + 3 \ln y = -2 \\ 3 \ln x + 5 \ln y = -4 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \ln(x^2 - y^2) = 0 \\ x-y=2 \end{cases} \quad ; \quad \begin{cases} 5x+4y=12 \\ \ln(x-1) + \ln y = \ln 3 - \ln 5 \end{cases}$$

خواص جبرية

$$\ln\left(\frac{\sqrt{5}+1}{2}\right) + \ln\left(\frac{\sqrt{5}-1}{2}\right) \quad : \quad \text{بسط :}$$

$$4 \ln(\sqrt{2}+1) + 4 \ln(\sqrt{2}-1) - 5 \ln 2$$

$$\frac{\ln(\sqrt{3}+1) + \ln(\sqrt{3}-1)}{2}$$

$$\frac{7}{16} \ln(3+2\sqrt{2}) - 4 \ln(\sqrt{2}+1) - \frac{25}{8} \ln(\sqrt{2}-1)$$

$$2 \ln e^4 \quad ; \quad 8 - \ln \frac{1}{e}$$

و a و b عددان حقيقيان موجبان قاما . 2

$$\ln b + \ln a \text{ بدلالة } 6 \ln \frac{1}{\sqrt{a^2 b^3}} \text{ و } \ln a^2 b^3$$

3 عبر عن الأعداد التالية بدلالة 2 و 5 . $\ln 5$ و $\ln 2$

$$\ln 6,25 \quad : \quad \ln \frac{16}{25} \quad : \quad \ln 500$$

$$\ln \frac{1}{2} + \ln \frac{2}{3} + \dots + \ln \frac{98}{99} + \ln \frac{99}{100}$$

4 في كل حالة من الحالات التالية، عين العدد

$$\left(\frac{1}{4}\right)^n \leq 10^{-2} \quad ; \quad 2^n \leq 10^3 \quad : \quad \text{ال الطبيعي } n \text{ حيث :}$$

$$1 - \left(\frac{2}{5}\right)^n \geq 0,3 \quad ; \quad \left(\frac{3}{4}\right)^{n-1} \leq 0,1$$

معادلات

5 حل كل معادلة من المعادلات التالية في \mathbb{R}

$$\ln x = \frac{1}{2} \quad ; \quad \ln x = -2 \quad ; \quad \ln x = 2$$

$$[\ln x]^2 = 4 \quad ; \quad \ln x^2 = 4 \quad ; \quad \ln|x| = 2$$

6 حل في \mathbb{R} كل معادلة من المعادلات التالية :

$$\ln(1-x)^2 = 4 \ln 2 \quad ; \quad \ln(1-x) = 2 \ln 3 - 3 \ln 2$$

$$\ln \sqrt{1-x} = \frac{1}{2} \ln 3 \quad ; \quad \ln\left(\frac{1}{1-x}\right) = -3 \ln 2$$

7 حل كل معادلة من المعادلات التالية في \mathbb{R}

$$\ln(2x+7) = \ln(x-3)$$

$$\ln x + \ln(3x+2) = \ln(2x+3)$$

$$\ln(x-3) = \ln(x+7) - \ln(x+1)$$

$$\ln(x^2 - 2x - 3) = \ln(x+7)$$

ćمارين و مسائل

16) g هي الدالة المعرفة على \mathbb{R} كما يلي:

$$g(x) = \frac{e^{2x}}{e^x + 4}$$

أثبت أنه يوجد عددان حقيقيان a, b حيث

من أجل كل عدد حقيقي x :

$$g(x) = ae^x + \frac{be^x}{e^x + 4}$$

عين الدالة الأصلية للدالة g التي تنعدم عند 0.

الدواال الأسية والدواال اللوغاريتم العشري

$$a = \frac{\sqrt[6]{6}(\sqrt[3]{2})^2\sqrt{12}}{\sqrt[3]{3^4}\sqrt[3]{6^2}} \quad \text{بسط كتابة العدد} \quad 17$$

بالرفع إلى القوة 6.

باستعمال القوى الناطقة.

$$\sqrt[5]{\frac{1}{32}} \quad \text{بسط الأعداد التالية:} \quad 18$$

$$\frac{(\sqrt[3]{4})^2 \sqrt[4]{2}}{\sqrt[10]{4^3}} \quad ; \quad \frac{\sqrt[5]{4^2} \sqrt[4]{2}}{\sqrt[3]{8}}$$

حل في \mathbb{R} كل معادلة من المعادلات التالية:

$$9^x - 3^{x+2} = \frac{3^5}{4} \quad ; \quad 4^x + 3 \times 2^x + 10 = 0$$

$$x^{\frac{1}{x}} = \left(\frac{1}{x}\right)^x \quad ; \quad 2^{2x} + 2^{2x-1} = 3^{x+\frac{1}{2}} + 3^{x-\frac{1}{2}}$$

19) عين مجموعة تعريف و الدالة المشتقة f'

لكل دالة من الدوال f التالية:

$$f(x) = 2^x \quad ; \quad f(x) = x^{\frac{2}{3}}$$

$$f(x) = x^x \quad ; \quad f(x) = x^2 3^x$$

$$f(x) = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \quad ; \quad f(x) = (\ln x)^x$$

20) عين نهايات الدالة f عند حدود مجموعة

تعريفها في كل حالة من الحالات التالية:

$$f(x) = x^x \quad ; \quad f(x) = x^{\frac{1}{3}}$$

$$f(x) = \frac{x^x}{\ln x} \quad ; \quad f(x) = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$$

النهايات

12) عين النهايات عند 0 و عند $+\infty$ لكل من

الدواال التالية (عند وجودها):

$$x \mapsto \sqrt{1 + (\ln x)^2} \quad ; \quad x \mapsto \frac{\ln x}{\sqrt{x}}$$

$$x \mapsto \frac{\ln x - 2}{\ln x + 1} \quad ; \quad x \mapsto x - 2 \ln x$$

13) عين النهايات عند $+\infty$ لكل دالة من الدواال

التالية : (عند وجودها)

$$x \mapsto x \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) \quad ; \quad x \mapsto \frac{\ln x}{x - \ln x}$$

$$x \mapsto x \ln\left(\frac{2x - 3}{x}\right) \quad ; \quad x \mapsto \frac{x^2 \ln x}{1 + x}$$

$$x \mapsto x - (\ln x)^2 \quad ; \quad x \mapsto \ln\left(\frac{1 + 2e^x}{e^{2x} - 1}\right)$$

الدواال المشتقة

14) في كل حالة من الحالات التالية، عين

مجموعة قابلية إشتتقاق للدالة f ثم عبر عن (f')

$$f(x) = \ln|7 - 2x| \quad ; \quad f(x) = \ln(5x - 1)$$

$$f(x) = x^2 \ln x \quad ; \quad f(x) = \ln\left(\frac{x + 1}{x - 2}\right)$$

$$f(x) = 3x + \ln(1 + e^{-2x}) \quad ; \quad f(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$$

$$f(x) = \ln(4x^2 - 3x - 1) \quad ; \quad f(x) = \ln\left(\frac{e^{2x} - 1}{e^{2x} + 1}\right)$$

$$f(x) = \frac{\ln x}{\sqrt{x}} \quad ; \quad f(x) = x^2 \ln(1 + x)$$

تعيين دوال أصلية

15) f دالة معرفة على \mathbb{R} كما يلي :

$$f(x) = \frac{e^x - 2}{2e^x + 1}$$

أثبت أنه يوجد عددان حقيقيان a, b حيث من

$$f(x) = a + \frac{be^x}{2e^x + 1} \quad ; \quad \text{أجل كل عدد حقيقي } x \quad ; \quad$$

عين دالة أصلية للدالة f على \mathbb{R} .

ćمارين و مسائل

25 f هي الدالة المعرفة \mathbb{R} كما يلي :

$$f(x) = x - 4 + \ln(1 + e^{3x})$$

و (\mathcal{C}) هو المنحنى الممثل للدالة f في المستوى المنسوب إلى معلم متعمد و متجانس $(\mathbb{J}, \mathbb{T}; 0)$.

١. أثبت أن الدالة f متزايدة تماماً على \mathbb{R} .

٢. احسب نهاية $\ln(1 + e^{3x})$ عند $-\infty$.

٣. استنتج وجود مستقيم مقارب للمنحنى (\mathcal{C}) ثم عين معادلة له.

٤. بين أن من أجل كل عدد حقيقي x ,

$$f(x) = 4x - 4 + \ln(1 + e^{-3x})$$

٥. ما هي نهاية $\ln(1 + e^{-3x})$ عند $+\infty$ ؟

٦. استنتاج وجود مستقيم مقارب آخر للمنحنى (\mathcal{C}) ثم عين معادلة له.

٧. ارسم المستقيمين المقاربين والمنحنى (\mathcal{C}) في نفس المعلم.

26 f هي الدالة العددية المعرفة كما يلي :

$$f(x) = \ln\left(\frac{e^{2x} + 5}{e^{2x} - 2}\right)$$

و (\mathcal{C}) المنحنى الممثل للدالة f في المستوى المنسوب إلى معلم متعمد و متجانس $(\mathbb{J}, \mathbb{T}; 0)$.

١. ما هي مجموعة التعريف E للدالة f ؟

٢. ادرس تغيرات الدالة f وكذا نهاياتها عند حدود مجموعة التعريف E .

٣. لتكن g الدالة المعرفة على E كما يلي

$$g(x) = f(x) - x$$

٤. عين نهاية (x) g لما يؤول x إلى $+\infty$.

٥. ادرس إشارة (x) g .

٦. ماذا يمكن استنتاجه بالنسبة إلى المنحنى (\mathcal{C}) ؟

٧. ارسم المنحنى (\mathcal{C}) .

22 عين دالة أصلية للدالة f على المجال A

في كل حالة من الحالات التالية :

$$A = [0; +\infty[: f(x) = x^{\frac{2}{3}}$$

$$A = [0; +\infty[: f(x) = x^2 \sqrt{x}$$

$$A = \mathbb{R} : f(x) = 5^x$$

مسائل

23 نعتبر الدالة f المعرفة كما يلي

$$f(x) = (x - 1) \ln(x^2)$$

و (\mathcal{C}) المنحنى الممثل لها في المستوى المنسوب إلى معلم متعمد و متجانس $(\mathbb{J}, \mathbb{T}; 0)$.

١. عين مجموعة تعريف الدالة f .

٢. عين نهايات f عند حدود مجموعة تعريفها.

٣. ادرس تغيرات الدالة f .

٤. حل المعادلة $f(x) = 0$.

٥. ارسم المنحنى (\mathcal{C}) .

24 نعتبر الدالة f المعرفة كما يلي

$$f(x) = \ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right)$$

و (\mathcal{C}) المنحنى الممثل لها في المستوى المنسوب إلى معلم متعمد و متجانس $(\mathbb{J}, \mathbb{T}; 0)$.

١. عين D_f مجموعة تعريف الدالة f .

٢. بين أن من أجل كل عدد حقيقي x من D_f $(-x)$ ينتمي إلى D_f و $f(-x) = -f(x)$.

٣. ما هو التفسير البياني الذي تعطيه لهذه النتيجة؟

٤. بين أن المنحنى (\mathcal{C}) يقبل ثلاث مستقيمات مقارية يطلب تعين معادلة لكل منها.

٥. ادرس تغيرات الدالة f .

٦. عين معادلة الماس (Δ) للمنحنى (\mathcal{C}) عند النقطة ذات الفاصلة e .

٧. ارسم (Δ) و (\mathcal{C}) في المعلم السابق.