

## 4 - التشابهات المستوية المباشرة

### تعريف

- التشابه المستوي المباشر

λ عدد حقيقي موجب تماما.

نسمى تشابهاً مستوياً مباشراً نسبته λ كل تحويل نقطي S للمستوي في نفسه حيث : من أجل كل النقط A, B, M من المستوي ذات الصور A', B', M' على الترتيب وفق S

$$\text{يكون : } \begin{cases} A'B' = \lambda AB \\ (\overrightarrow{A'B'} ; \overrightarrow{A'M'}) = (\overrightarrow{AB} ; \overrightarrow{AM}) + k2\pi \end{cases} \quad (k \in \mathbb{Z})$$

• التشابه المباشر الذي نسبته 1 يسمى تقاييساً موجباً، ويسمى كذلك إزاحة.

• الإزاحة هي تقاييس يحفظ المسافات والزوايا الموجهة.


• كل إزاحة هي إنسحاب أو دوران.

• التحويل المطابق للمستوي هو تشابه مباشر نسبته 1.

• كل انسحاب في المستوي هو تشابه مباشر نسبته 1.

• كل دوران هو تشابه مباشر نسبته 1.

• كل تحاك نسبته λ هو تشابه مباشر نسبته |λ|.



### • خواص

S تحويل نقطي للمستوي.

• التحويل S تشابه مباشر إذا وفقط إذا كان S مركب تحاك و إزاحة.

• كل تشابه مباشر هو تحويل مطابق أو إنسحاب أو يقبل نقطة صامدة وحيدة تسمى مركز التشابه.

• كل تشابه مباشر  $(\omega; \lambda)$  يمكن اعتباره مركباً تبديلياً لدوران  $(\theta; \omega)$  و تحاك  $(\lambda; \omega)$  حيث  $0 < \lambda < 1$ . أي  $\lambda = r\omega$ .

• كل تشابه مباشر مرکزه  $\omega$  هو تشابه مباشر يتميز بالعناصر التالية : المركز  $\omega$ ، النسبة  $\lambda$  ( $\lambda > 0$ ) و الزاوية  $\theta$  ( $\theta = \omega - \lambda\omega$ ) هو قيس لزاوية التشابه) حيث من أجل كل نقطة M تختلف عن  $\omega$  :

$$\text{عن } \omega : \begin{cases} \omega M' = \lambda \omega M \\ (\overrightarrow{\omega M} ; \overrightarrow{\omega M'}) = \theta + k2\pi \end{cases} \quad (k \in \mathbb{Z})$$


• من أجل كل نقطتين A و B حيث A' و B' صورتاهما على الترتيب بالتشابه المباشر الذي نسبته λ

$$\text{و زاويته } \theta, \begin{cases} A'B' = \lambda AB \\ (\overrightarrow{AB} ; \overrightarrow{A'B'}) = \theta + k2\pi \end{cases} \quad (k \in \mathbb{Z})$$

• إذا كانت A, B, A' و B' أربع نقاط من المستوي بحيث  $A \neq B$  و  $A' \neq B'$  فإنه يوجد تشابه مباشر

$$\text{و حيد } S \text{ حيث } S(B) = A' \text{ و } S(A) = B'$$

## • تركيب تشابهين مباشرين



• مركب تشابهين مباشرين لهما نفس المركز  $\omega$  هو تشابه مباشر مركزه  $\omega$ .

$$\text{أي } S(\omega, \lambda', \theta') \circ S(\omega, \lambda, \theta) = S(\omega, \lambda\lambda', \theta + \theta')$$

$$\text{و } S(\omega, \lambda, \theta) \circ S(\omega, \lambda', \theta') = S(\omega, \lambda\lambda', \theta' + \theta)$$

• كل تشابه مباشر يحول مثلثا إلى مثلث مشابه له مباشرة

(الآن كل زاويتين متقابلتين فيهما متقيايسنان

ولهم نفس الاتجاه).

## • التعبير عن تشابه مباشر بالأعداد المركبة تعريف

المستوي منسوب إلى معلم متعامد و متجانس  $(j, i; 0)$ .

كل تشابه مباشر يرفق بنقطة  $M'(z)$  النقطة  $M(z)$  كل تشابه  $z' = az + b$  حيث  $a$  و  $b$  عدادان مركبان و  $a \neq 0$ .

كل تحويل نقطي  $T$  يرفق بنقطة  $M'(z)$  النقطة  $M(z)$ . حيث  $z' = az + b$  حيث  $a$  و  $b$  عدادان مركبان و  $a \neq 0$ ، هو تشابه مباشر نسبته  $|a|$ .

إذا كان  $1 = a$  فإن التحويل  $T$  انسحاب شعاعه  $(b)\vec{v}$ .

إذا كان  $1 \neq a$  فإن  $T$  يقبل نقطة صامدة واحدة  $\omega$  لاحتقتها  $\frac{b}{1-a}$  و  $T$  هو مركب تبديلية لتحول مركزه  $\omega$  و نسبته  $|a|$  و دوران مركزه  $\omega$  (نفس مركز التحاكي) و زاويته  $\arg(a)$ .

نقول إن  $T$  هو تشابه مباشر مركزه  $\omega$  و نسبته  $|a|$ ، و زاويته  $\arg(a)$ .

**ملاحظة:** يمكن تعريف التشابه  $S(\omega, k, \theta)$  الذي يرفق بنقطة  $M'(z)$  النقطة  $M(z)$

$$\text{بالعلاقة } z' - z_0 = ke^{i\theta}(z - z_0).$$

## • خواص


التشابه $S(\omega,  k , \theta)$	التحاكي $\bar{h}(\omega; k)$ :	الدوران $(\omega; \theta)$
يكبر (أو يصغر) بضرب المسافات في $k^2$	يكبر (أو يصغر) بضرب المسافات في $k$	يحفظ المسافات والمساحات
يحفظ الزوايا الموجهة، المرجع التوازي، التعامد، التقاطع، الاستقامية، التماس.	يحفظ الزوايا الموجهة، المرجع، التوازي، التعامد، التقاطع، الاستقامية، التماس.	يحفظ الزوايا الموجهة، المرجع التوازي، التعامد، التقاطع، الاستقامية، التماس.
يتحول مستقيما إلى مستقيم.	يتحول مستقيما إلى مستقيم يوازيه.	يتحول مستقيما إلى مستقيم.
يتحول دائرة $(O; R)$ إلى الدائرة $O' = S(O; R')$ حيث $R' =  k R$	يتحول دائرة $(O; R)$ إلى الدائرة $O' = r(O)$ حيث $R' = kR$	يتحول دائرة $(O; R)$ إلى الدائرة $O' = r(O)$ حيث $R' = kR$

## ١ التعرف على تشابه مباشر

### تمرين ١

مربع مركزه  $O$  حيث  $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}) = \frac{\pi}{2}$ . تحويل نقطي يحول  $O$  إلى  $B$  و  $D$  إلى  $C$ . اثبت أن  $T$  تشابه مباشر مركزه  $A$ . حدد نسبته و زاويته.

حل




نفرض أن المربع  $ABCD$  موجه توجيهها مباشرة لدينا  $\overrightarrow{O} \xrightarrow{T} B$  و  $\overrightarrow{O} \xrightarrow{T} B$ .  
نضع  $\frac{BC}{OD} = \frac{\alpha}{\sqrt{2}\alpha}$  حيث  $\alpha > 0$ . لدينا  $AB = \alpha$   
إذن  $BC = \sqrt{2} OD$ . ولدينا  $(\overrightarrow{OD}, \overrightarrow{BC}) = \frac{\pi}{4} + k2\pi$  حيث  $k \in \mathbb{Z}$ .  
إذا فرضنا أن صورة  $A$  هي  $A'$  فإن المثلثين  $AOD$  و  $A'B'C'$  متتشابهان مباشرون.  
فإن المثلث  $A'B'C'$  قائم في  $B$  و متساوي الساقين. أي أن المثلث  $A'B'C'$  ينطبق على المثلث  $ABC$ .  
وبالتالي  $A'$  تنطبق على  $A$  (النقطة  $A$  صامدة بالتحويل  $T$ ).  
إذن  $T$  تشابه مركزه  $A$  و نسبة  $\sqrt{2}$  و زاويته  $\frac{\pi}{4}$ .

### تمرين ٢

مربع مركزه  $O$  حيث  $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}) = \frac{\pi}{2}$ .  $S_A, S_C$  و  $S_O$  تشابهات مباشرة حيث  $S_C$  مركزه  $C$  و يحول  $O$  إلى  $B$ .  $S_A$  مركزه  $A$  و يحول  $B$  إلى  $D$ .  $S_O$  مركزه  $O$  و يحول  $B$  إلى  $D$ .  
عين النسبة و زاوية كل من التشابهات  $S_O, S_A$  و  $S_C$ .

حل



نضع  $AB = \alpha$ .  
نسبة التشابه  $S_C$  هي  $\frac{CB}{CO}$  و زاويته هي قيس  $(\overrightarrow{CO}, \overrightarrow{CB})$ .  
حساب : لدينا  $\frac{CB}{CO} = \frac{CA}{CO}$  و المثلث  $ABC$  قائم في  $A$  و متساوي الساقين. إذن  $AC = \alpha\sqrt{2}$ . ينتج أن  $\frac{CB}{CO} = \frac{CA}{CO} = \frac{\alpha\sqrt{2}}{\alpha} = \sqrt{2}$ .  
وبالتالي  $S_C = \frac{CB}{CO} = \frac{2CB}{CA} = \frac{2\alpha}{\alpha\sqrt{2}} = \frac{2}{\sqrt{2}}$ .

حساب قيس للزاوية ( $\vec{CO}$ ,  $\vec{CB}$ ). نلاحظ أن ( $CO$ ) هو منصف الزاوية ( $\vec{CD}$ ,  $\vec{CB}$ ).

إذن  $\frac{\pi}{4}$  قيس للزاوية الموجهة ( $\vec{CO}$ ,  $\vec{CB}$ ). وبالتالي نسبة التشابه  $S_c$  هي  $\sqrt{2}$  و زاويته  $\frac{\pi}{4}$ .

لدينا  $S_A = \frac{AD}{AB}$  و زاويته ( $\vec{AB}$ ,  $\vec{AD}$ )  $A \xrightarrow{A} A$   $B \xrightarrow{B} D$ .

حساب  $S_A = \frac{AD}{AB}$  : لدينا 1 ، إذن نسبة التشابه  $S_A$  هي 1.

حساب قيس للزاوية ( $\vec{AD}$ ,  $\vec{AB}$ ) : هذه الزاوية قائمة و موجهة في الاتجاه المباشر. إذن  $\frac{\pi}{2}$  قيس لهذه

الزاوية. وبالتالي نسبة التشابه  $S_A$  هي 1 و زاويته  $\frac{\pi}{2}$ .

لدينا  $S_0 = \frac{OD}{OB}$ . نسبة  $S_0$  هي 1 و زاويته ( $\vec{OB}$ ,  $\vec{OD}$ )  $O \xrightarrow{O} O$   $B \xrightarrow{B} D$  ، وهي زاوية مستقيمة

و  $\pi$  قيس لها. وبالتالي نسبة التشابه  $S_0$  هي 1 و زاويته  $\pi$ .

إذن  $S_0$  دوران مركزه  $O$  و زاويته  $\pi$ . يمكن اعتبار  $S_0$  أيضا تحاكيا مركزه  $O$  و نسبته 1-

و هو أيضا تناظر مركزه  $O$ .

### تمرين 3

$\triangle ABC$  مثلث متقارن الأضلاع،  $A$  منتصف  $[AC]$ . نسمي  $S$  التشابه المباشر الذي يتركز على  $A$

ويحول  $B$  إلى  $A$ .

عين نسبة التشابه  $S$  و زاويته.

انشئ النقطة  $D$  سابقة  $C$  بالتشابه  $S$ . بره إجابتك.


### حل

لدينا  $S = \frac{AI}{AB}$ . إذن نسبة التشابه  $S$  هي  $\frac{AI}{AB}$ .

حيث  $(\vec{AB}, \vec{AI}) = \frac{\pi}{3}$  ، و زاويته  $\frac{AI}{AB} = \frac{1}{2}$ .

إذن  $S$  تشابه مباشر مركزه  $A$  ، نسبته  $\frac{1}{2}$  و زاويته  $\frac{\pi}{3}$ .

$S(D) = C$  يعني  $C = S(D)$ .



إذن  $AC = \frac{1}{2}AD$  و  $(\vec{AD}, \vec{AC}) = \frac{\pi}{3}$ . وبالتالي النقطة  $D$

تنتمي إلى  $(AB)$  حيث  $AD = 2AB$ .

إذن  $D$  هي نظيرة  $A$  بالنسبة إلى  $B$ . (الشكل)

## تمرين 4

المستوي منسوب إلى معلم متعمد ومتجانس  $(0; \vec{i}, \vec{j})$ .

$T$  التحويل النقطي الذي يرقق بكل نقطة  $M'(x'; y')$  النقطة  $M(x; y)$  حيث  $\begin{cases} x' = x - y + 3 \\ y' = x + y - 4 \end{cases}$  لتكن  $z$  لاحقة  $M$  و  $z'$  لاحقة  $M'$ .

عَبَرْ عن  $z$  بدلالة  $z'$ .

حدد طبيعة التحويل  $T$  و عناصره المميزة.

## حل

نضع  $z' = x' + iy'$  و  $Z = x + iy$  فيكون

$$\begin{aligned} z' &= x' + iy' = (x - y + 3) + i(x + y - 4) \\ &= x - y + 3 + ix + iy - 4i \\ &= (x + iy) + i(x + iy) + 3 - 4i = (1 + i)(x + iy) + 3 - 4i \\ z' &= (1 + i)z + 3 - 4i \end{aligned}$$

إذن

و هذه الكتابة على الشكل  $az + b$ . حيث  $a \neq 0$  إذن التحويل النقطي  $T : M(z) \rightarrow M'(z')$  حيث  $(1 + i)z + 3 - 4i = z'$  تشابه مباشر، مركزه النقطة الصامدة  $z_0$  ذات اللاحقة  $z_0$ . حل المعادلة  $i z = 4 + 3i$  أي  $z = (1 + i)^{-1}(4 + 3i)$

إذن مركز التشابه  $T$  هو  $(4 + 3i)$ . نسبة  $|1 + i| = \sqrt{2}$  و زاويته  $\arg(1 + i)$  أي  $\frac{\pi}{4}$ . إذن التحويل  $T$  تشابه مباشر مركزه  $(4 + 3i)$  و نسبة  $\sqrt{2}$  و زاويته  $\frac{\pi}{4}$ .

## التعبير عن تشابه مباشر بالأعداد المركبة 2

### تمرين 1

المستوي منسوب إلى معلم متعمد ومتجانس  $(0; \vec{i}, \vec{j})$ .

عَبَرْ عن التشابه المباشر  $S$  بالعبارة  $z' = az + b$  حيث  $a$  و  $b$  عدوان مركبان في كل حالة مما يلي :

$S$  إنسحاب شعاعه  $\vec{v}(3 - 2i)$ .

$S$  تشابه مباشر مركزه  $O$  و نسبة  $\sqrt{3}$  و زاويته  $-\frac{\pi}{6}$ .

$S$  تشابه مباشر مركزه  $(4 - 3i)$  و نسبة  $2$  و زاويته  $\frac{\pi}{2}$ .

## حل

لتكن  $(z)$  نقطة من المستوي صورتها وفق  $S$  النقطة  $M'(z')$ .

الانسحاب الذي شعاعه  $\vec{v}(3 - 2i)$  معرف بالعبارة  $z' = z + b$ .

إذن الانسحاب  $S$  الذي شعاعه  $\vec{v}(3 - 2i)$  يُعرف كما يلي :

• التشابه  $S$  حيث  $(z_0, \omega, k, \theta)$  ، يعرف بالعبارة  $(z - z_0) = k e^{i\theta} (\omega z)$

إذن التشابه  $S(O, \sqrt{2}, -\frac{\pi}{6})$  يعرف بالعبارة  $z' = \sqrt{3} e^{-i\frac{\pi}{6}} z$

أو أيضاً :  $z' = \left(\frac{3}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}\right) z$  أي  $z' = \sqrt{3} \left(\cos \frac{\pi}{6} - i \sin \frac{\pi}{6}\right) z$

**ملاحظة :** يعرف التشابه  $S(O, \sqrt{3}, -\frac{\pi}{6})$  كما يلي :

من أجل كل نقطة  $M$  تختلف عن  $O$ . حيث  $\begin{cases} OM' = \sqrt{3}OM \\ (\overrightarrow{OM}, \overrightarrow{OM'}) = -\frac{\pi}{6} + k2\pi \end{cases}$

بنتج أن  $\arg \frac{z'}{z} = -\frac{\pi}{6} + k2\pi$  حيث  $\left| \frac{z'}{z} \right| = \sqrt{3}$

إذن  $z' = \sqrt{3} e^{-i\frac{\pi}{6}} z$  أو  $\frac{z'}{z} = \sqrt{3}$

نلاحظ أن هذه العلاقة صحيحة من أجل النقطة الصامدة  $O$  مركز التشابه  $S$ .

• لدينا التشابه  $S(\omega, 2, \frac{\pi}{2})$  حيث  $\omega$  النقطة ذات اللاحقة  $i - 3i$ .

إذن التشابه  $S$  يعرف بالعبارة  $z' = 2iz - 2 - 11i$  أو  $z' = 2e^{i\frac{\pi}{2}}(z - (4 - 3i))$

**ملاحظة :** يمكن إعطاء تفسير هندسي كالتالي : التشابه  $S(\omega, 2, \frac{\pi}{2})$  يرافق بكل نقطة  $M$  من المستوى

النقطة  $M'$  حيث  $(\overrightarrow{\omega M}, \overrightarrow{\omega M'}) = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$  و  $\omega M' = 2\omega M$  مع  $k \in \mathbb{Z}$

أو أيضاً  $(\overrightarrow{\omega M}, \overrightarrow{\omega M'}) = \frac{\pi}{2} + k2\pi$  ،  $\frac{\omega M'}{\omega M} = 2$

وبالتالي  $\arg \frac{z' - z_0}{z - z_0} = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$  حيث  $\left| \frac{z' - z_0}{z - z_0} \right| = 2$

إذن  $z' = 2iz - 2 - 11i$  . بعد الحساب و تعويض  $z_0$  نجد  $\frac{z' - z_0}{z - z_0} = 2e^{i\frac{\pi}{2}}$

## تمرين 2

المستوى منسوب إلى معلم متعامد و متجانس  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ .

لتكن النقط  $D(-1; 5), A(1; 0), B(-1; 1), C(0; 2)$  و  $(1; 0)$

عين التشابه المباشر  $S$  الذي يحول  $A$  إلى  $C$  و يحول  $B$  إلى  $D$ .

## حل

$S$  تشابه مباشر يعني أنه يوجد عددان مركبان  $a$  و  $b$  حيث  $(a \neq 0)$  و  $z' = az + b$

$S$  يحول  $A$  إلى  $C$  يعني  $z_C = az_A + b$  و  $S$  يحول  $B$  إلى  $D$  يعني  $z_D = az_B + b$

لدينا  $z_D = -1 + 5i$  ،  $z_C = 2i$  ،  $z_B = -1 + i$  ،  $z_A = 1$

وبتعويض  $z_D, z_C, z_B, z_A$  نجد الجملة ذات المجهولين  $a$  و  $b$  التالية :

$$\begin{cases} a + b = 2i \\ (-1 + i)a + b = -1 + 5i \end{cases}$$

إذن  $z' = (1 - i)z - 1 + 3i$

# طريق

**ملاحظة :** يمكن أن نكتب العلاقة الأخيرة تحليليا بوضع  $z = x + iy$  و  $z' = x' + iy'$  لدينا  $\begin{cases} x' = x + y - 1 \\ y' = -x + y + 3 \end{cases}$  و نجد  $x' + iy' = (1 - i)(x + iy) - 1 + 3i$

## تمرين 3

المستوي منسوب إلى معلم متعامد و متجانس  $(0; \vec{i}, \vec{j})$ .  
ليكن  $S$  التشابه المباشر المعرف بالعلاقة  $i z - 3 + z' = (1 - i)z$ .  
حدد العناصر المميزة للتشابه  $S$ .

## حل

التحويل  $S$  ليس إنسحابا لأن  $i \neq 1 - i$ .  
إذن  $S$  يقبل نقطة صامدة وحيدة  $z_0$  لاحتقها حل المعادلة  $i$  هذه المعادلة تكافئ  $i - iz = 3 - i$  إذن  $z = 1 + 3i$  و بالتالي مركز التشابه  $S$  هو النقطة  $(1 + 3i)$ .  
نسبة التشابه  $S$  هي  $|i - 1| = \sqrt{2}$ . زاوية التشابه  $S$  هي عدمة للعدد  $i - 1$  و لتكن  $\frac{\pi}{4}$ .  
إذن  $S$  تشابه مباشر مركزه  $(1 + 3i)$  و نسبته  $\sqrt{2}$  و زاويته  $\frac{\pi}{4}$ .

## تمرين 3

### تمرين 1

عين عبارة كل من التحويلين  $S_1$  و  $S_2$  ثم العناصر المميزة لكل منها.

## حل

كل من  $S_1$  و  $S_2$  تشابه مباشر.  
لتكون النقطة  $M$  ذات اللاحقة  $z$  والنقطة  $M'$  صورة  $M$  وفق  $S_1 \circ S_2$ .  
لدينا  $M' = S_1 \circ S_2(M) = S_1[S_2(M)]$ .  
عبارة  $S_1 \circ S_2$  تحسب كما يلي :  $z' = (\sqrt{3} - i)[iz - i] = (1 + i\sqrt{3})z - 1 - i\sqrt{3}$   
إذن عبارة التشابه  $S_1 \circ S_2$  هي  $z' = (1 + i\sqrt{3})z - 1 - i\sqrt{3}$  تعين العناصر المميزة للتشابه  $S_1 \circ S_2$ .

مركز  $S_1 \circ S_2$  هو النقطة الصامدة  $z_0$  لاحتقها حل المعادلة  $z_0 = (1 + i\sqrt{3})z_0 - 1 - i\sqrt{3}$ .  
ينتج أن  $z_0 = \frac{3 - i\sqrt{3}}{3}$  أي  $(1 - \frac{i\sqrt{3}}{3})$ .

نسبة  $S_1 \circ S_2$  هي  $|1 + i\sqrt{3}| = 2$ . زاوية  $S_1 \circ S_2$  هي  $\arg(1 + i\sqrt{3}) = \frac{\pi}{3} + 2k\pi$  حيث  $k \in \mathbb{Z}$ .  
ينتج أن  $S_1 \circ S_2$  تشابه مباشر مركزه  $(1 - \frac{i\sqrt{3}}{3})$  و نسبته 2 و زاويته  $\frac{\pi}{3}$ .

و بنفس الطريقة نعين عبارة  $S_2 \circ S_1$ .

$$z' = i [(\sqrt{3} - i) z] - i = (1 + i\sqrt{3}) z - i \quad \text{لدينا}$$

$$z' = (1 + i\sqrt{3}) z - i \quad \text{إذن عبارة التشابه } S_2 \circ S_1 \text{ هي}$$

تعيين العناصر المميزة للتشابه  $S_2 \circ S_1$  : مركز  $S_2 \circ S_1$  هو النقطة  $\omega$  لاحقتها

$$(z = \frac{\sqrt{3}}{3}) \quad \text{أي } z = (1 + i\sqrt{3}) z - i \quad \text{حل المعادلة}$$

.  $k \in \mathbb{Z}$  :  $\arg(1 + i\sqrt{3}) = \frac{\pi}{3} + 2k\pi$  ، الزاوية هي  $|1 + i\sqrt{3}| = 2$  ، النسبة هي

$$\text{إذن } S_2 \circ S_1 \text{ تشابه مباشر مركزه } (\frac{\sqrt{3}}{3})' \text{ ، نسبته } 2 \text{ ، زاويته } \frac{\pi}{3}.$$

**ملاحظة :** يمكن تعين عناصر كل من  $S_1 \circ S_2$  و  $S_2 \circ S_1$  اعتماداً على إعطاء العبارة المركبة لكل من  $S_1$  و  $S_2$ . إذا فرضنا أن  $\alpha + i\beta$  هي لاحقة مركز  $S_1 \circ S_2$ .

$$\text{بوضع } z_1 = -\beta + i(\alpha - 1) \quad \text{أي } S_2(\omega) = A$$

$$\text{و } (\sqrt{3} - i) z_1 = \alpha + i\beta \quad \text{أي } S_1(A) = \omega$$

$$\text{ينتjg أن } .\alpha + i\beta = (\sqrt{3} - i)(-\beta + i(\alpha - 1))$$

$$\text{و بالتالي : } .\beta = \frac{\sqrt{3}}{3} \quad \left\{ \begin{array}{l} 2\alpha + \beta\sqrt{3} = 1 \\ \sqrt{3}\alpha = \sqrt{3} \end{array} \right. \quad \text{أي } 1 \quad \text{إذن } \alpha = 1 \quad \text{و } \beta = \beta + \sqrt{3}\alpha - \sqrt{3}$$

أي أن لاحقة  $\omega$  ، مركز التشابه  $S_1 \circ S_2$  هي  $1 + i\frac{\sqrt{3}}{3}$  و نسبة  $S_1 \circ S_2$  هي جداً نسبتي  $S_1$  و  $S_2$

أي  $1 \times 2$ . زاوية  $S_1 \circ S_2$  هي مجموع زاويتي  $S_1$  و  $S_2$  أي  $\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{6}$

و بنفس الطريقة نعين العناصر المميزة للتشابه  $S_2 \circ S_1$ .

## تمرين 2

ABC مثلث (الشكل). ننشئ على أضلاع هذا المثلث المربعات ABDE و CAHI ، BCFG. ليكن 'A' مركز المربع و 'B' مركز المربع CAHI و 'C' مركز المربع ABDE. نعتبر التشابه المباشر  $S_C$  الذي مركزه C و نسبته  $\sqrt{2}$  و زاويته  $\frac{\pi}{4}$  و التشابه المباشر  $S_B$  الذي مركزه B و نسبته  $\frac{1}{\sqrt{2}}$  و زاويته  $\frac{\pi}{4}$ . عين صورتي 'A' و 'B' بالتحويل  $S_B \circ S_C$ . استنتج أن 'A'B' = CC' و أن  $(A'B') \perp (CC')$ .

$S_c$  التشابه الذي مركزه  $C$  و نسبته  $\sqrt{2}$  و زاويته  $\frac{\pi}{4}$ .

(لأن  $CA = \sqrt{2} CB'$  و  $\angle CA = \frac{\pi}{4}$ ) و بالمثل  $S_B$  التشابه الذي مركزه  $B$  و نسبته  $\frac{1}{\sqrt{2}}$

. ( $\angle BA = \frac{\pi}{4}$  و  $BC' = \frac{1}{\sqrt{2}} BA$  و زاويته  $\frac{\pi}{4}$  لأن  $S_B(A) = C'$ ).

نعلم أن  $S_B(A) = C'$  :  $S_c(A') = F$  :  $S_c(B') = A$

.  $S_B \circ S_c(B') = C'$  و  $S_B \circ S_c(A') = S_B(F) = C$  إذن  $S_c(B') = C'$

و بما أن نسبة التشابه  $S_B \circ S_c$  هي  $\sqrt{2} \times \frac{1}{\sqrt{2}} = 1$  أي  $A'B' = CC'$  فهو تقابس موجب (أي إزاحة). إذن  $A'B' \perp CC'$ .

و بما أن زاوية التشابه  $S_c$  هي  $\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$  أي  $\angle A'B' = \frac{\pi}{2}$  إذن  $(A'B') \perp (CC')$ .

ينتظر أن  $A'B' = CC'$  و  $(A'B') \perp (CC')$ .

#### ٤ تحليل تشابه مباشر

#### تمرين

٥ التشابه المباشر الذي يرافق بكل نقطة  $M(z)$  النقطة  $M'(z')$

حيث  $z' = (\sqrt{3} - i)z + 1 + i(\sqrt{3} - i)$ .

حل ٥ إلى تحاكم و دوران.

عبارة التشابه ٥ من الشكل :  $b = 1 + i(\sqrt{3} - 1)$ ,  $a = \sqrt{3} - i$  حيث  $z' = az + b$

تعيين العناصر المميزة للتشابه ٥.


لاحقة المركز  $\omega$  هي  $z_0 = \frac{1 + i(\sqrt{3} - 1)}{1 - (\sqrt{3} - i)}$  أي  $z_0 = \frac{b}{a}$ . نجد

النسبة هي  $2 = |a| = |\sqrt{3} - i|$ . الزاوية هي  $\arg(a) = \arg(\sqrt{3} - i) = -\frac{\pi}{6} + 2k\pi$ .

إذن ٥ تشابه مركزه  $(-\frac{\pi}{6})$ , نسبته 2 وزاويته  $-\frac{\pi}{6}$ .

وبالتالي ٥ يمكن تحليله إلى مركب تبديلية لتحاكم  $h$  مركزه  $\omega$  و نسبته 2

و دوران  $r$  مركزه  $\omega$  و زاويته  $-\frac{\pi}{6}$ .



## مارين و حلول موجبة

### تمرين 1

- المستوي منسوب إلى معلم متعامد و متجانس  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ .
- $A$ ،  $\omega$  نقطتان لاحتاها على الترتيب  $1$ ،  $\frac{1}{3}(3 + i\sqrt{3})$ .
- 1 . عين قيسا للزاوية  $(\overrightarrow{OA}; \overrightarrow{\omega})$ . استنتج قيسا للزاوية  $(\overrightarrow{\omega O}; \overrightarrow{\omega A})$  و قيمة  $\frac{\omega A}{\omega O}$ .
- ما هي عبارة التشابه  $S$  الذي يحول  $O$  إلى  $A$ ؟
- 2 . هو الإنسحاب الذي شعاعه  $\vec{j}$ .
- حدد نسبة و زاوية التشابه  $s_1$  حيث  $S = s_2 \circ t$ .

### حل

1 . تعين قيس للزاوية  $(\overrightarrow{OA}; \overrightarrow{\omega})$ .

$$z_\omega = \frac{\sqrt{3}}{3} (\sqrt{3} + i) \cdot k \in \mathbb{Z} \quad \text{حيث } (\overrightarrow{OA}; \overrightarrow{\omega}) = \arg z_\omega + k2\pi$$

$$\sin(\overrightarrow{OA}; \overrightarrow{\omega}) = \frac{1}{2} \quad \cos(\overrightarrow{OA}; \overrightarrow{\omega}) = \frac{\sqrt{3}}{2} \quad |z_\omega| = \frac{2}{\sqrt{3}}$$

$$\text{إذن } (\overrightarrow{OA}; \overrightarrow{\omega}) = \frac{\pi}{6} + k2\pi$$

$$(\overrightarrow{\omega O}; \overrightarrow{\omega A}) \text{ أي } \frac{\pi}{3} \quad (\overrightarrow{\omega O}; \overrightarrow{\omega A}) = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{6} + k2\pi$$

$$\frac{\omega A}{\omega O} = \sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$$

عبارة التشابه  $S$  الذي يحول  $O$  إلى  $A$ :

التشابه الذي يحول  $O$  إلى  $A$  معرف بمركزه  $\omega$  و نسبته  $\frac{1}{2}$  و زاويته  $\frac{\pi}{3}$ .

$$\text{و يعرف أيضا بالعبارة } z - z_\omega = \frac{1}{2} e^{i\frac{\pi}{3}} (z - z') \quad \text{و بعد تعويض } z_\omega \text{ بالعدد } \frac{1}{3}(3 + i\sqrt{3})$$

$$\text{و الاختصار نجد } z' = \left( \frac{1}{4} + i \frac{\sqrt{3}}{4} \right) z + 1$$

2 . تحديد نسبة و زاوية التشابه المباشر  $s_1$  حيث  $S = t \circ s_1$ .

لتكن  $k_1$  نسبة التشابه المباشر  $s_1$ . نعلم أن نسبة  $S$  هي  $\frac{1}{2}$  و نسبة  $t$  هي  $1$ .

$$\text{إذن نسبة } S_1 \text{ تتحقق } 1 \times k_1 = \frac{1}{2} \quad \text{أي } k_1 = \frac{1}{2}$$

ينتظر أن نسبة التشابه المباشر  $s_1$  هي  $\frac{1}{2}$ . لدينا زاوية  $S$  هي  $\frac{\pi}{3}$  و زاوية  $t$  منعدمة.

لتكن  $\theta_1$  زاوية التشابه  $s_1$ . إذن  $\theta_1$  تتحقق  $0 + \theta_1 = \frac{\pi}{3}$ . أي  $\theta_1 = \frac{\pi}{3}$ .

ينتظر أن زاوية التشابه المباشر  $s_1$  هي  $\frac{\pi}{3}$ .


· باستعمال نفس الطريقة نعين نسبة و زاوية التشابه المباشر  $s_2$ . و نجد: نسبة  $s_2$  هي  $\frac{1}{2}$  و زاويته  $\frac{\pi}{3}$ .

# تقارين و حلول موجبة

## تمرين 2

مثلث  $ABC$  متسق الأضلاع،  $A'$  منتصف  $[AC]$ ،  $B'$  منتصف  $[AB]$ ،  $C'$  منتصف  $[BC]$ . عين تشابها مباشرا  $S$  بحيث يحول  $A$  إلى  $A'$ ،  $B$  إلى  $B'$ ،  $C$  إلى  $C'$  (يمكن أن يعبر عنه بركب تحويلين معروفين).

### حل



ليكن  $\omega$  مركز ثقل المثلث  $ABC$  (نقطة تلاقى متوسطات المثلث  $ABC$ ). التحاكي  $h$  الذى مركزه  $\omega$  ونسبة  $\frac{1}{2}$  يحول  $A$  إلى  $C$  ( $A$  إلى  $A'$  و  $C$  إلى  $C'$ ). الدوران  $\tau$  الذى مركزه  $\omega$  وزاويته  $\frac{2\pi}{3}$  يحول  $C$  إلى  $A'$  ( $C$  إلى  $B'$  و  $A'$  إلى  $C'$ ). أي أن  $A \xrightarrow{h} C \xrightarrow{\tau} A'$ .

التحاكي  $h$  الذى نسبته سالبة  $(-\frac{1}{2})$  يمكن أن يعبر عنه بركب (تبديل) لتحاك  $h_1$  مركزه  $\omega$  ونسبة  $\frac{1}{2}$  ودوران  $\tau_1$  مركزه  $\omega$  وزاويته  $\pi$  أي  $h = \tau_1 \circ h_1$  إذن  $S = \tau_0 \circ h = \tau_0(\tau_1 \circ h_1)$ .

التحول  $\tau_1 \circ h_1$  هو تشابه مباشر مركزه  $\omega$  ونسبة  $\frac{1}{2}$  وزاويته  $\pi$ .

أى  $\tau$  تشابه مباشر مركزه  $\omega$ ، نسبته 1 (دوران) وزاويته  $\frac{2\pi}{3}$ .

إذن  $S$  تشابه مركزه  $\omega$ ، نسبته  $\frac{1}{2}$  وزاويته  $\frac{\pi}{3}$  (أو  $\frac{5\pi}{3}$ ).

بنفس الطريقة نبرهن أن  $S(B) = B'$  و  $S(C) = C'$ .

نستنتج أن التشابه المباشر الذى يحول  $A$  إلى  $A'$ ،  $B$  إلى  $B'$ ،  $C$  إلى  $C'$  هو التشابه المباشر الذى

مركزه  $\omega$  مركز ثقل المثلث  $ABC$ ، ونسبة  $\frac{1}{2}$  وزاويته  $\frac{\pi}{3}$ .

## تمارين و مسائل

6  $m$  عدد مركب،  $T$  تحويل نقطي يرفق بكل

نقطة  $M(z)$  من مستوي منسوب إلى معلم متعامد و متاجنس مباشر النقطة  $M'(z')$  حيث  $z' = az + b$  حيث  $a, b \in \mathbb{C}$

$$a \in \mathbb{C}^*, b \in \mathbb{C}$$

نفرض أن صورة  $A(-1 + 6i)$  هي  $(2 + 3i)$  وصورة  $B$  هي  $C(m)$  وفق  $T$ .

1. عين  $m$  حتى يكون  $T$  انسحابا.

2. عين  $m$  حتى يكون  $T$  دورانا. حدد مركزه و زاويته.

7 مثلث  $ABC$  متساوياً الأضلاع حيث

$$[\vec{AB}; \vec{AC}] = \frac{\pi}{3}, A \text{ منتصف } [BC]$$

$S$  التشابه المباشر الذي مركزه  $C$  و يتحول  $A$  إلى  $A$ .

1. عين نسبة  $S$  و زاويته.

2. أنشئ النقطة  $D$  سابقة  $B$  وفق  $S$ .

8 نفس التمرين السابق من أجل التشابه المباشر

$S_A$  الذي مركزه  $A$  و يتحول  $B$  إلى  $A$ .

9 مثلث  $ABC$  متساوي الساقين في  $A$

و  $A$  منتصف  $[BC]$ .  $L$  نقطة تقاطع  $[AC]$

و الدائرة التي قطرها  $[AI]$ .

أثبت أن التشابه المباشر الذي مركزه  $A$  و يتحول  $A$

إلى  $B$  يتحول أيضا  $L$  إلى  $A$ .

10  $\omega, A$  و  $B$  نقط من المستوي و  $S$  التشابه المباشر

الذي مركزه  $\omega$  و يتحول  $A$  إلى  $A'$  و  $B$  إلى  $B'$ .

1. برهن أن التشابه الذي مركزه  $\omega$  و الذي يتحول

إلى  $B$  يتحول أيضا  $A'$  إلى  $B'$ .

2. ماذا تستنتج بالنسبة إلى المثلثين

$$\omega BB' \text{ و } \omega AA'?$$

## التعرف على تشابه مباشر

في التمارين ①، ②، ③، المستوى منسوب إلى معلم متعامد و متاجنس مباشر.

1 عين العناصر المميزة للتشابه المباشر  $S$  الذي يرفق بكل نقطة  $M(z)$  النقطة  $M'(z')$  في كل حالة مما يلي:

$$z' = -iz + 4 \quad .1$$

$$z' = (1 - i\sqrt{3})z + 1 \quad .2$$

$$z' = (1 + i)z - 1 - i \quad .3$$

$$z' = -2z + 3 + 2i \quad .4$$

2 نفس السؤال في كل حالة مما يلي :

$$z' = z + 3 - 4i \quad .1$$

$$z' = 2iz \quad .2$$

$$z' = \frac{\sqrt{2}}{2}(1+i)z + 1 - \frac{\sqrt{2}}{2}(1+i) \quad .3$$

$$z' = (\sqrt{3} + i)z \quad .4$$

3  $A, B$  و  $C$  نقط لواحقها على الترتيب

$-3i$  :  $1$  :  $4i$  .3. عين النسبة و زاوية التشابه  $S$  الذي مركزه  $A$  و يتحول  $B$  إلى  $C$ .

4  $ABCD$  مربع مركزه  $O$  حيث  $[\vec{AB}; \vec{AD}] = \frac{\pi}{2}$  عين النسبة و زاوية التشابه  $S$  في كل حالة مما يلي :

1.  $S$  مركزه  $A$  و يتحول  $O$  إلى  $D$ .

2.  $S$  مركزه  $C$  و يتحول  $D$  إلى  $B$ .

3.  $S$  مركزه  $O$  و يتحول  $A$  إلى  $C$ .

5 المستوى منسوب إلى معلم متعامد و متاجنس مباشر. ليكن  $T$  التحويل النقطي الذي يرفق بكل

نقطة  $M(z)$  النقطة  $M'(z')$  حيث  $z' = 2\alpha z + 1 + i$  حيث  $\alpha \in \mathbb{C}$

عين قيم  $\alpha$  حتى يكون

1.  $T$  إنسحابا.

2.  $T$  دورانا.

3.  $T$  تحاكيا نسبته 4.

## تمارين و مسائل

### التعبير عن تشابه مباشر بالأعداد المركبة

في التمارين ⑪ و ⑫ المستوى منسوب إلى معلم متعامد و متجانس في التمارين ⑪ و ⑫ المستوى منسوب إلى معلم متعامد و متجانس مباشر.

**11** في كل ما يلي عبر عن التشابه المباشر  $S$  بالأعداد المركبة.

1. مركز  $S$  هو  $(i + 2)$ ، نسبته  $\frac{1}{2}$  و زاويته  $\frac{\pi}{2}$ .

2. مركز  $S$  هو  $(i - \frac{5}{2})$ ، نسبته  $2$  و زاويته  $\frac{\pi}{3}$ .

3. مركز  $S$  هو  $(1; 1)$ ، نسبته  $\sqrt{2}$  و زاويته  $\frac{\pi}{4}$ .

4. مركز  $S$  هو  $(1; -1)$ ، يحول  $(3; 5)$  إلى  $(0; -2)$ .

**12**  $A, B, C, D$  نقط من المستوى لواحقها

على الترتيب  $i - 1, 2i, 7i, 5 + 3i$ . علم النقط  $D, C, B, A$ .

2. عين العبارة المركبة التي تعرف التشابه المباشر  $S$  حيث  $C = S(A)$  و  $D = S(B)$ .

**13** المستوى منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس  $ABCD$ ،  $(A; \vec{AB}, \vec{AD})$  مربع، 1. مركزه  $M$  و  $K$  منتصف  $[CD]$ .  $S$  منتصف  $[CD]$ . التشابه المباشر الذي يحول  $A$  إلى 1 و يحول  $C$  إلى  $K$ .

1. ما هي لواحق النقط  $A, C, 1, K$ ؟

2. عرف التشابه  $S$  بالأعداد المركبة.

3. استنتج العناصر المميزة للتشابه  $S$ .

### تركيب تشابهين مباشرين

**14** المستوى منسوب إلى معلم متعامد و متجانس مباشر.  $S$  و  $S'$  التشابهان المباشران المعرفان على

الترتيب بالعباراتين  $z' = (1 + i)z + i$  ثم  $z = az + b$

و  $b \in \mathbb{C}$ ،  $a \in \mathbb{C}^*$  حيث  $z' = az + b$ .

1. عين مركز  $S$  و نسبته و زاويته.

2. عين العلاقة بين  $a$  و  $b$  بحيث يكون

$S \circ S' = S' \circ S$ . ما هو مركز  $S$ ؟

**15**  $(A; \vec{AB}, \vec{AC})$  معلم متعامد و متجانس

مباشر. 1. منتصف  $[BC]$ . ليكن  $R_B$  الدوران الذي مرکزه  $B$  و زاويته  $\frac{\pi}{2}$  ،  $T$  الإنسحاب الذي شعاعه  $\vec{BC}$  و  $R_C$  الدوران الذي مرکزه  $C$  و زاويته  $\frac{\pi}{2}$ .

1. ما هي صورة 1 وفق  $S = R_C \circ T \circ R_B$  ؟

2. عبر بالأعداد المركبة عن التحويل  $S$ .

3. ما هي طبيعة التحويل  $S$ ؟ حدد عناصره المميزة.

### مسائل

**16** المستوى منسوب إلى معلم متعامد و متجانس

مباشر  $(\vec{j}, \vec{i}; 0)$ .

نسمي  $S$  التحويل الذي يرفق بكل نقطة  $M(z)$

النقطة  $M'(z')$  حيث  $M'(z') = (-1 + i)z + 2 - i$

1. بين أن  $S$  تشابه مباشر يطلب تعين عناصره المميزة.

2. ليكن  $S'$  التحويل الذي يرفق بكل نقطة  $M$

النقطة  $G$  مركز ثقل المثلث  $MM'M''$ .

حيث  $M'' = S(M)$  و  $M' = S(M'')$ .

احسب بدلالة  $z$  لاحقة النقطة  $G$ .

أثبت أن  $S'$  تشابه مباشر ثم حدد مركزه.

عين لاحقة النقطة  $M_1$  حيث  $O = S(M_1)$  و  $O$  مبدأ المعلم.

علم النقط  $M_1, M'_1, M''_1$  ثم  $M_1$

حيث  $M''_1 = S(S(M_1))$  و  $M'_1 = S(M''_1)$ .

**17** المستوى منسوب إلى معلم متعامد و متجانس

مباشر  $(\vec{j}, \vec{i}; 0)$ .

$A, B, C$  نقط من المستوى لواحقها على الترتيب

$-\frac{1}{2} + \frac{i}{2}, 1 - i, i$ .

## تارين و مسائل

- ٤٠. عَبَرَ عَنْ لَاحقِي الشَّعاعِينَ  $\overrightarrow{M\omega}$ ,  $\overrightarrow{MM'}$ ,  $\overrightarrow{Mz}$  بدلالة  $z$  لاحقة  $M$ .
- استنتج أن  $MM' = M\omega$ .
- احسب، من أجل كل نقطة  $M$  تختلف عن  $\omega$ ، قيساً للزاوية  $(\overrightarrow{MM'} ; \overrightarrow{M\omega})$ .
- ٥٠. عَيَّنْ صورة  $L$  منتصف  $[OC]$  بالدوران الذي يتركه  $A$  منتصف  $[OA]$  وزاويته  $\frac{\pi}{2}$ .

- ٥ التحويل الذي يرفق بنقطة  $M$  ذات اللاحقة  $z$  النقطة  $M'$  ذات اللاحقة  $z'$  حيث  $z = \frac{(1+i)z + 1 - i}{3}$
١. أثبت أن  $S$  تشابه مباشر يطلب اعطاء عناصره المميزة.
  ٢. أثبت أن النقط  $A, B, \omega$  على استقامة واحدة حيث  $\omega$  مركز التشابه  $S$ .
  ٣. عَيَّنْ قيس للزاوية  $(\overrightarrow{OB} ; \overrightarrow{OC})$ . أثبت أن المستقيم  $(OC)$  هو صورة المستقيم  $(OB)$  وفق  $S$ .
  ٤. عَيَّنْ النقطتين  $O'$  و  $B'$  صورتي  $O$  و  $B$  على الترتيب بالتحويل  $S$ .
  ٥. أثبت أن صورة  $(OB)$  هي  $(O'O')$  ثم استنتاج أن النقط  $O, O'$  و  $C$  على استقامة واحدة.
  ٦. أثبت أن  $\omega$  و  $C$  نقطتان من الدائرة التي قطراها  $[O'B]$ .

**١٨** المستوى منسوب إلى معلم متعمد و متجانس مباشرة  $(j, i; \bar{o})$ .

- نعتبر التحويل  $S$  الذي يرفق بكل نقطة  $M$  من المستوى ذات الاحداثيين  $(x; y)$  النقطة  $M'$  ذات الاحداثيين  $(y'; x')$  حيث  $\begin{cases} x' = x - y + 4 \\ y' = x + y + 4 \end{cases}$
١. عَيَّنْ اللاحقة  $z'$  للنقطة  $M'$  بدلالة اللاحقة  $z$  للنقطة  $M$ .
  ٢. عَيَّنْ طبيعة التحويل  $S$  و عناصره المميزة.
  ٣.  $A, B, C$  نقط من المستوى لواحقها على الترتيب  $-4, 4i, 4 + 4i$ .
  ٤. حَدَّ صورتي كل من  $A$  و  $B$  بالتحويل  $S$  ثم عَيَّنْ صورة المستقيم  $(OA)$  و صورة محور القطعة  $[OA]$  بالتحويل  $S$ .

# حلول التمارين و المسائل

## التشابهات المباشرة

تعطى العناصر المميزة للتشابه 5 في الجدول أدناه.

ملاحظة	الزاوية	النسبة	الحالة المركزية	الحالة المركبة
دوران	$\frac{\pi}{2}$	1	$2 - 2i$	1
تشابه مباشر	$-\frac{\pi}{3}$	2	1	2
تشابه مباشر	$\frac{\pi}{4}$	$\sqrt{2}$	$2 - i$	3
تناظر مركبة	$\pi$	2	$1 + \frac{\pi}{4}i$	4

2

انسحاب شعاعي $(3 - 4i)$				1
تشابه مباشر	$\frac{\pi}{2}$	2	0	2
دوران	$\frac{\pi}{4}$	1	1	3
تشابه مباشر	$\frac{\pi}{6}$	2	0	4

دوران مركز A، زاويته  $-\frac{\pi}{2}$  3

نسبة التشابة 4 نضع  $AB = \alpha$  ،  $k = \alpha > 0$

5. قيس زاوية له.

$$\theta = (\widehat{\overrightarrow{AO}, \overrightarrow{AD}}) = \frac{\pi}{4}, k = \frac{AB}{AO} = \sqrt{2} \cdot 1$$

التشابه 5.  $\theta = (\widehat{\overrightarrow{CD}, \overrightarrow{CB}}) = \frac{\pi}{2}$  ،  $k = \frac{CB}{CD} = 1 \cdot 2$  دوران.

$$\theta = (\widehat{\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OC}}) = \pi, k = \frac{OC}{OA} = 1 \cdot 3$$

5. تناظر مركزي مركز O.

5.1 انسحاب من أجل  $\alpha = \frac{1}{2}$  5

5.2 دوران من أجل  $\alpha = \frac{1}{2}$  مع  $|m| = \frac{1}{2}$  T.

5.3 تحاكي نسبة 4 من أجل 2

5.4 تناظر مركزي من أجل  $\alpha = -\frac{1}{2}$  T.

5.5 من أجل 5 = m : T انسحاب شعاعي 6

لحوظته  $3 - 3i$

5.6 من أجل -1 : m = T دوران مركزه 0

لحوظتها  $i - 3$  و زاويته  $-\frac{\pi}{2}$

## حلول التمارين و المسائل

$$\tilde{z}' = \frac{i}{2}\tilde{z} - \frac{3}{2} + 2i \cdot 1 \quad (11)$$

$$\tilde{z}' = (1 + i\sqrt{3})\tilde{z} + \frac{5\sqrt{3}}{2} + \frac{5\sqrt{3}}{2}i \cdot 2$$

$$\tilde{z}' = (1 + i)\tilde{z} + 1 - i \cdot 3$$

$$\tilde{z}' = -\frac{i}{2}\tilde{z} - \frac{3}{2} + \frac{i}{2} \cdot 4$$

1. تعلم النقط في مستوى منسوب إلى معلم متعامد و متجانس.

$$2. \text{ تعلم } \tilde{z}' = (3 - i)\tilde{z} + 3 - 3i \quad (12)$$


- معلم متعامد و متجانس.

1. لواحق النقط A, C, I, K هي على الترتيب

$$\frac{1}{2} + i : \frac{1}{2} + \frac{i}{2} : 1 + i : 0$$

لدينا  $\tilde{z}_K = a\tilde{z}_C + b$ ,  $\tilde{z}_I = a\tilde{z}_A + b$ .

و بعد التعويض والاختصار نجد  $a = \frac{1+i}{4}$



إذن عبارة  $S = \frac{1+i}{2}b$ .

$$\tilde{z}' = \frac{1+i}{4}\tilde{z} + \frac{1+i}{2}$$

لاحقة  $\omega$  مركز S هو حل

$$\tilde{z} = \frac{2}{5} + \frac{4}{5}i \quad \text{أي } \tilde{z}' = \frac{2}{5} + \frac{4}{5}i$$

1. لاحقة  $\omega$  مركز S هي حل المعادلة

$$\tilde{z} = 2i \quad \text{أي } \tilde{z}' = \tilde{z}$$

نسبة S هي  $\sqrt{2}$ , زاوية S هي  $\theta = \frac{\pi}{4}$ .

العلاقة بين a, b بحيث يكون  $SOS' = S'O'S'$

$$2(1-a)i - b = 0$$

أي  $a = 1$

،  $S'$  انسحاب،  $a = 1$

، لاحقة مركز  $S'$  هي  $2i$ .


1. صور A وفق S حيث  $S = R_B O T O R_B$  في المعلم المتعامد والمتجانس المباشر (A;  $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}$ )

نعين لاحقة J حيث  $(I) = R_B(J)$  و  $J = \left(\frac{i}{2}\right)$

لدينا  $R_B$  معرف كما يلي

$$\tilde{z}' = i\tilde{z} + 1 - i$$

1. ليكن k نسبة  $S_C$ ,  $\theta$  زاويته.



$$k = \frac{CI}{CA} = \frac{1}{2}$$

$$\theta = (\overrightarrow{CA}, \overrightarrow{CI}) = \frac{\pi}{3}$$

$$S_C(D) = B \quad (1)$$

$$\begin{cases} CB = \frac{1}{2} CD \\ (\overrightarrow{CD}, \overrightarrow{CB}) = \frac{\pi}{3} \end{cases}$$

إذن D نظيرة C بالنسبة إلى A (الشكل).

1. ليكن k نسبة  $S_A$  حيث I

$$k = \frac{AI}{AB} = \cos \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\theta = (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AI}) = \frac{\pi}{6}$$

$$2. \text{ انشاء } D' \text{ حيث } S_A(D') = B$$


$$\begin{cases} AB = \frac{\sqrt{3}}{2} AD' \\ (\overrightarrow{AD'}, \overrightarrow{AB}) = \frac{\pi}{6} \end{cases}$$

لدينا  $D'$  تقاطع العمودي على (AC) في A و العمودي على (AB) في B (انظر شكل التمرين 7).

9. المثلثان AIB و AJC

متتشابهان إذن التشابه  $S_A$

الذي يتحول A إلى B يتحول أيضا J إلى C.



10. من أجل التشابه المباشر

$$\text{يكون } \frac{\omega B}{\omega A} = \frac{\omega B'}{\omega A'} \quad \text{أي } \frac{\omega B'}{\omega A'} = \frac{\omega B}{\omega A}$$

و من أجل تشابه  $S_{\omega}$  الذي مرکزه  $\omega$  و يتحول إلى B

$$\frac{\omega B}{\omega A} = \frac{\omega B'}{\omega A'} \quad \text{و لدينا ما سبق}$$

أي أن  $S_{\omega}$  يتحول A إلى  $A'$ .

2. نستنتج أن المثلثين  $\omega BB'$ ,  $\omega AA'$  متتشابهان.

## حلول التمارين و المسائل

فإن صورة  $(OB)$  هي  $(O'O')$  بالتشابه  $S$ .  
نتحقق أن  $O'B = -\frac{3}{2} \vec{OO'}$ . إذن النقط  $O, O', C$  على استقامة واحدة. (يمكن ملاحظة أن  $O'$  صورة  $O$  تنتهي إلى  $(OC)$  و بالتالي  $O, O', C$  على استقامة واحدة).

4. نبرهن أن  $\widehat{\omega B}, \widehat{\omega O'} = \frac{\pi}{2}$  و بالتالي  $\omega$  تنتهي إلى الدائرة التي قطراها  $[O'B]$ .  
نبرهن أيضاً أن  $\widehat{CO'}, \widehat{CB} = \frac{\pi}{2}$ . إذن  $C$  تنتهي إلى الدائرة التي قطراها  $[O'B]$ .

$$z' = (1 + i)z + 4 + 4i \quad \text{--- 18}$$

5. تشابه مباشر مركزه  $(-4 + 4i)$ ، نسبته  $\sqrt{2}$  و زاويته  $\frac{\pi}{4}$ .

$$\begin{aligned} z_0 &= z_c : \quad z_{A'} = z_0 \\ S(O) &= C \quad \text{و } S(A) = O \end{aligned} \quad \text{بما أن } O = O'$$

فإن صورة  $(OA)$  بالتحويل  $S$  هي  $(OC)$ .  
وصورة محور القطعة  $[OA]$  هي محور القطعة  $[OC]$ .

4. لاحقة  $M'$  هي  $\overrightarrow{MM'} = \overrightarrow{M\omega} + 4 + 4i$   
لاحقة  $M$  هي  $\overrightarrow{M\omega} = -z - 4 + 4i$   

$$\begin{aligned} MM' &= |(-y + 4) + i(x + 4)| \\ &= |(-x - 4) + i(-y + 4)| = M\omega \\ (\overrightarrow{MM'}, \overrightarrow{M\omega}) &= \arg\left(\frac{-z - 4 + 4i}{i\omega + 4 + 4i}\right) = \arg i = \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$
  
أي من أجل كل نقطة  $M$  تختلف عن  $\omega$ ,  
 $\widehat{MM'}, \widehat{M\omega} = \frac{\pi}{2}$

5. لـ  $J$  صورة  $L$  منتصف  $[OC]$

بالدوران الذي مركزه  $A$  و زاويته  $\frac{\pi}{2}$ .

$$J \text{ تحقق } JA = J'A \quad \text{و } \widehat{JJ'} = \frac{\pi}{2}$$

(يمكن تعين الدوران الذي مركزه  $A$  و زاويته  $\frac{\pi}{2}$  ثم إيجاد لاحقة  $J$ ).


ونعى لاحقة  $J$  وهي  $i - \frac{1}{2}$ .  
نعى لاحقة  $K$  حيث  $J = T(K)$  و  $i = K - 1$ .  
فنجد  $\left(-\frac{1}{2}\right)$ .

نعى لاحقة  $L$  حيث  $R_C(K) = L$ .  
و  $i = \frac{1}{2} + iz + 1$  فتجد  $R_C(z') = iz + 1 + i$   
أي أن صورة  $L$  بالتحويل  $S$  هي منتصف  $[BD]$ .  
2. شاعر  $S = R_C \circ R_T \circ R_B$ :  $z' = -z + 1 + i$   
3. أي النقطة  $S$  هو تناظر مركزه منتصف  $[BC]$  أي النقطة  $O$  مركز المربع  $ABDC$ .

16. 5. تشابه مباشر مركزه  $(1, 1)$ , نسبته  $\sqrt{2}$  و زاويته  $\frac{3\pi}{4}$ .

لاحقة  $M$  هي  $z = -\frac{i}{3}z + 1 + \frac{i}{3}$  حيث  $z$  لاحقة  $M$ .  
1. تشابه مباشر مركزه  $(1, 1)$ .

لاحقة  $M_1$  هي  $S'(M_1) = 3i - 1$ .  
النقطة  $M''_1, M'_1, M_1$  في الشكل.



17. 5. تشابه مباشر مركزه  $\left(\frac{3}{5}, -\frac{1}{5}i\right)$  و نسبته  $\frac{\sqrt{2}}{3}$  و زاويته  $\frac{\pi}{4}$ .

2. نتحقق أن  $\overrightarrow{BA} = \frac{3}{5} \overrightarrow{B\omega}$   
إذن  $A, B, \omega$  على استقامة واحدة.

3.  $\widehat{(OB), (OC)} = \text{Arg} \frac{z_c}{z_b} = \frac{\pi}{4}$   
بما أن  $\widehat{(OB), (OC)} = \frac{\pi}{4}$  وهي زاوية التشابه  $S$  فإن  $(OC)$  هو صورة  $(OB)$  وفق  $S$ .

$B' = O(0; 0) : O'\left(\frac{1}{3}, -\frac{1}{3}i\right)$   
بما أن  $\widehat{(OB), (OO')} = \frac{\pi}{4}$  وهي زاوية التشابه  $S$ .